

**Repertorium specierum nobarum regni
vegetabilis**

Herausgegeben von Prof. Dr. phil. Friedrich Fedde.

Beihefte ✓ Band XCVIII

**Enumeratio Florae
Constantinopolitanae.**

Aufzählung der nach dem Erscheinen von Boissiers
Flora Orientalis aus der Umgebung von Konstantinopel
bekannt gewordenen Farn- und Blütenpflanzen

von

Karl Heinz Rechinger (filius)
Wien.

Mit einer Kartenskizze.

Ausgegeben am 1. Februar 1938.

Preis 10.— RM.

0451
50

DAHLEM bei BERLIN
FABECKSTR. 49
1938.



31-1798

D 32-142/68/a 20,-

Vorliegende Arbeit bildet die Fortsetzung der von Karl Fritsch in den Denkschriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien, 68, p. 219—250 (1899) veröffentlichten gleichnamigen Arbeit, nämlich einer Bearbeitung der von Johann Nemetz in den Jahren 1894—97 in der Umgebung von Konstantinopel gesammelten Pflanzen.

Während die genannte Arbeit nur die Bearbeitung der Pilze (von K. v. Keisler), Flechten (von Julius Steiner), Algen (von Theodor Reinbold), Moose (von Franz Matauschek) und Farngewächse (von Karl Fritsch) enthält, folgt nunmehr, nach 37 Jahren, die Bearbeitung der Blütenpflanzen nach. Fritsch verließ nämlich Wien im Jahre 1899 und wirkte seitdem in Graz, wo er die von ihm bereits begonnene Bestimmung der Blütenpflanzen wegen Mangels an Vergleichsmaterial nicht fortsetzen konnte. Seit meiner ersten ägäischen Reise (1927) intensiv mit der ostmediterranen Flora beschäftigt, übernahm ich im Dezember 1932 die Kollektion Nemetz im Einverständnis mit Professor Fritsch und mit der Direktion des Botanischen Institutes der Universität Wien, die die Eigentümerin der Sammlung ist, und führte die Bestimmung zu Ende.

Zur Zeit als die Bestimmung der Blütenpflanzen von Fritsch begonnen wurde, war dies noch ein verhältnismäßig schwieriges Unternehmen, das, auf Boissiers Flora Orientalis fußend, an Hand einer Anzahl von Florenwerken benachbarter Gebiete und systematischer Spezialarbeiten nur allmählich fortschreiten konnte. Heute ist die Bestimmungsarbeit durch Hayeks inzwischen erschienenen Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae wesentlich erleichtert. Allerdings ist auch die floristische Erforschung der Umgebung von Konstantinopel inzwischen bedeutend gefördert worden, insbesondere durch die zahlreichen Arbeiten von Aznavour (vergl. Literaturverzeichnis), sodaß die Ergebnisse der Nemetz'schen Aufsammlungen bereits überholt wurden und ihnen nicht mehr die Bedeutung zukommt wie vor 40 Jahren.

Die bloße Aufzählung der von Nemetz gesammelten Arten böte also nur ein geringes Interesse. Außer einer neuen Art und wenigen neuen Varietäten haben sich keine Neuigkeiten ergeben und auch die Zahl der für die Umgebung von Konstantinopel neuen Arten ist relativ gering. So stand ich nun vor der Wahl, entweder die gesamte inzwischen erschienene floristische Literatur durchzugehen und nur die einer Veröffentlichung würdigen Angaben von Nemetz zusammenzustellen oder aber alle zerstreuten Angaben zusammenzufassen. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden, von der Erwägung ausgehend, daß eine solche Zusammenstellung für ein in pflanzengeographischer Hinsicht so hochinteressantes Gebiet eine willkommene Basis für pflanzengeographische Untersuchungen des Gebietes selbst

und der angrenzenden Gegenden darstelle und so von bleibendem Wert sei.

In der systematischen Anordnung und Nomenklatur folge ich hierbei Hayeks Prodromus, die Arten innerhalb der Gattungen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Berücksichtigt wurden alle einschlägigen Angaben aus den im Literaturverzeichnis genannten Arbeiten, in dem Bestreben, möglichst alle seit Boissiers Flora Orientalis bekannt gewordenen floristischen Daten aus der Umgebung Konstantinopels zu erfassen. Die von Nemetz in der Umgebung von Brussa auf dem Bityhnischen Olymp gesammelten Arten wurden mit aufgenommen, obwohl diese Orte außerhalb der näheren Umgebung von Konstantinopel liegen; Angaben vom Bityhnischen Olymp aus der Literatur wurden jedoch nicht berücksichtigt. — Bei Krauses Arbeit über die Gehölze der Türkei wurden nur die Literaturstellen, nicht aber die Fundorte zitiert. — Auf alle für das Gebiet in Betracht kommenden systematischen Arbeiten, die nach dem Abschluß von Hayeks Prodromus erschienen sind, habe ich in Fußnoten verwiesen, manche von ihnen enthalten wichtige, das Gebiet betreffende Fundortsangaben.

Aznavour gibt vielfach keine Fundorte an, sondern nur, ob er die betreffende Art in der europäischen oder asiatischen Hälfte des Konstantinopler Gebietes beobachtet hat. Auch in der älteren Literatur, besonders bei Boissier, finden sich meist nur allgemeine Angaben wie etwa »in agro Byzantino«, »ad Bosporum« etc. Hier sind nun gerade Nemetz' Fundortsangaben berufen, Lücken auszufüllen; denn bei der mosaikartigen Zusammensetzung der thrakischen Flora (vergl. Mattfeld: Die pflanzengeogr. Stellung Ost-Thrakiens. — Ber. Bot. Ver. Prov. Brandenburg, 71, 1929: 1—37, mit Karte) und dem streifen- und inselartigen Auftreten der mediterranen und kolchischen Florenelemente ist es durchaus nicht gleichgültig, an welcher Stelle eine Art beobachtet wurde.

Herrn Pfarrer F. E Wimmer in Wampersdorf, N. Oe., ehemals (von 1905 bis 1910) Lehrer an der Oesterreichischen Schule in Konstantinopel, bin ich für verschiedene Auskünfte zu Dank verpflichtet. Eine von ihm angelegte, etwa 400 Nummern umfassende Sammlung wurde in das Herbar des Naturhistorischen Museums in Wien eingereiht. Wimmers Funde wurden hier mit aufgenommen. Wimmer macht mich übrigens darauf aufmerksam, daß G. V. Aznavour eine Flora der Umgebung von Konstantinopel im Manuscript hinterlassen, das, wie sein Herbar und seine botanische Bibliothek nach seinem Tod in den Besitz des Robert-College in Therapia übergegangen ist. Herr Johann Nemetz, der gegenwärtig als Bürgerschul-Direktor i. R. in Wiener-Neustadt lebt, war so freundlich, mir auf eine schriftliche Anfrage hin nähere Mitteilungen über sein damaliges Exkursionsgebiet zu machen. — Bei der Zusammenstellung der Literatur und der Anfertigung der Liste wurde ich von meiner Frau, Dr. F. Rechinger unterstützt. — Einer Reihe von Spezialisten bin ich für Bestimmungen zu Dank verpflichtet. Ihr Name ist in der Aufzählung jeweils genannt.

Schriftenverzeichnis¹⁾ und Erklärung der Abkürzungen.

- Aznavour, G. V.: Notes sur la flore des environs de Constantinople. — Bull. Soc. Bot. France 44 (1897), p. 164—177. — Zitiert als „Azn. BSBF 44“.
- Novelles contributions à la flore de Constantinople. — Bull. Soc. Bot. France 46 (1899), p. 135—153. — Zitiert als „Azn. BSBF 46“.
 - Enumeration d' espèces nouvelles pour la flore de Constantinople accompagnée de notes sur quelques plantes peu communes ou insuffisamment décrites qui se rencontrent à l'état spontané aux environs de cette ville. — Mag. Bot. Lap. 1 (1902), p. 293—304, 2 (1903), p. 137—144, 3 (1904), p. 2—9, 4 (1905), p. 136—143, 5 (1906), p. 159—169, 10 (1911) p. 10—22. — Zitiert als „Azn. MBL 1 (bezw. 2, 3, 4, 5, 10)“.
 - Deux plantes nouvelles de la flore constantinopolitaine. — Mag. Bot. Lap. 6 (1907), p. 7—11. — Zitiert als „Azn. MBL 6“.
 - Une graminée nouvelle de la flore constantinopolitaine. — Mag. Bot. Lap. 10 (1900), p. 272—278. — Zitiert als „Azn. MBL 10“.
 - Nouveaux matériaux pour la flore constantinopolitaine. — Mag. Bot. Lap. 12 (1913), p. 156—185. — Zitiert als „Azn. MBL 12“.
- Béguinot, A.: Contribuzione alla Flora estivo-autunnale dell'isola di Prinkipo (Mare di Marmara). — Bull. Soc. Bot. Ital., Firenze 1912, p. 214—223. — Zitiert als „Bég.“.
- Bornmüller, J.: Ein Maiausflug in den „Wald von Belgrad“ bei Constantinopel. — Mitt. Thüring. Bot. Ver., N. F., 15. Heft, p. 29 (1900). — Zitiert als „Bornm.“.
- Degen, A. v.: Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten. III. Fünf neue Bürger der europäischen Flora. — Österr. Bot. Zeitschr. 41 (1891), S. 131. — Zitiert als „Degen 41“.
- *Malabaila obtusifolia* (Sibt. et Smith) Boiss. und einige Notizen zur Strandflora des Schwarzen Meeres. — Österr. Bot. Zeitschr. 45 (1895), S. 67. — Zitiert als „Degen 45“.
- Handel-Mazetti, H.: Ergebnisse einer botanischen Reise in das Pontische Randgebirge im Sandschak Trapezunt. — Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 23 (1909), S. 6—212. — Zitiert als „H. M.“ (enthält Angaben über die Insel Prinkipo).
- Krause, K.: Beiträge zur Flora von Kleinasien. I. — Rep. sp. nov. 22, 1926, p. 293—303 (Rep. europ. et medit. 1, p. 821—831). — Zitiert als „Krause 1“.
- Beitr. z. Fl. von Kleinas. II. — Rep. sp. nov. 24, 1927, p. 37—48 (Rep. eur. 2, S. 21—32). — Zitiert als „Krause 2“.
 - Beitr. z. Fl. v. Kleinas. III. — Rep. sp. nov. 25, 1928, S. 86—95 (Rep. eur. 2, S. 230—239). — Zitiert als „Krause 2“.
 - Beitr. z. Fl. v. Kleinas. IV. (Von nun an mit dem Untertitel „Die in der Türkei vorkommenden Bäume und Sträucher“. — Rep. sp. nov. 26, 1929, S. 322—337 (Rep. eur. 2, S. 562—577). — Zitiert als „Krause 2“.
 - Beitr. z. Fl. v. Kleinas. V. — Rep. sp. nov. 28, 1930, S. 77—80 und 113—139. (Rep. eur. 3, p. 157—160 und S. 161—187). — Zitiert als „Krause 3“. Enthält die Bearbeitung der Gattung *Salix* durch R. Görz.
 - Beitr. z. Fl. v. Kleinas. VI. — Rep. sp. nov., 30, 1932, S. 226—232 (Rep. eur. 3, S. 498—504) — Zitiert als „Krause 3“.
 - Beitr. z. Fl. v. Kleinas. VII. — (Druckfehler VI) — Rep. sp. nov. 33, 1934, S. 321—338. (Rep. eur. 3, S. 833—850). Zitiert als „Krause 3“. (Enthält die Bearbeitung der Gattung *Quercus* durch O. Schwarz).

¹⁾ Einige nur wenige einschlägige Angaben enthaltende Arbeiten wurden im Text ungekürzt zitiert.

Alle Fundortsangaben, nach denen kein Sammler genannt ist, stammen von Nemetz; W = Wimmer.

E = Europa, A = Asien. — In den wenigen Fällen, wo die Lage des Fundortes nicht zu ermitteln war, steht ein Fragezeichen.

Pteridophyta.¹⁾

Equisetaceae.

- Equisetum arvense* L. — Azn. BSBF 46: 152; Fritsch 249. — A: Anatol-Hisar, Kütschük-Gök-Su. — E: Kiathanesuja (Azn.).
E. hiemale L. — Azn. BSBF 44: 177. — E.
E. maximum Duv. — Azn. BSBF 46: 152 (als *E. Telmateja* Ehrh. mit β minor Lge.); Fritsch 249. — A: Anatol-Hissar, Kütschük-Gök-Su.; — E: Kilia (f. *serotina* A. Br.), Domusdere (Azn.).
E. ramosissimum Desf. — Azn. BSBF 44: 177 (als *E. ramosum* DC.); Fritsch 249. — E: (Azn.) Kütschük-Tschekmedsche, am See; Kilia. — A: (Azn.).

Ophioglossaceae.

- Ophioglossum vulgatum* L. — Azn. BSBF 44: 177. — A.

Osmundaceae.

- Osmunda regalis* L. — Fritsch 249. — A: Alem-Dagh.

Polypodiaceae.

- Polypodium vulgare* L. — Azn. MBL 12: 185; Fritsch 246. — E: (Azn.). — A: (Azn.) Adam-Pol.
Pteridium aquilinum (L) Kuhn. — Fritsch 246. — A: Kütschük-Gök-Su; Bithyn. Olymp, 1000 m; Dschamlidscha.
Adiantum capillus Veneris L. — Azn. BSBF 44: 177. — E.
Cheilanthes fragrans (L) Webb & Berth. — Azn. MBL 10: 21. — A: Prinkipo, (var. *neclecta* Azn.).
Anogramme leptophylla (L) Link. — Azn. BSBF 46: 152 (als *Gymnogramme* C. Desv.) — A: Prinkipo (Azn.).
Blechnum spicant (L) With. — Azn. BSBF 44: 177. — E: (Azn.) — A: (Azn.), Adam-Pol, Alem-Dagh.
Phyllitis Scolopendrium (L) Newm. — Azn. BSBF 44: 177 (als *Scolopendrium officinale* L.) — E.
Adiantum nigrum L. ssp. *Onopteris* Heufl. — Azn. MBL 12: 185. — Fritsch 247. — E: Belgrader Wald; Therapia (Azn.). — A: Zw. Beylerbey und Dschamlidscha (Azn.).
A. lanceolatum Huds. var. *ovatum* (Viv.) Moore — Azn. BSBF 46: 152 (als Art). — A: Prinkipo (Azn.), Drakoshügel (Azn.).
A. Ruta muraria L. — Fritsch 247. — E: Bagdsche-köj.
A. trichomanes L. — Azn. MBL 12: 185. Fritsch 247. — E: (Azn.), Bagdsche-köj. — A: (Azn.) Bithynischer Olymp, 1000 m.

¹⁾ Die von Fritsch in der eingangs erwähnten Arbeit mitgeteilten Angaben wurden hier der Vollständigkeit halber nochmals mit aufgenommen.

- Ceterach officinarum* DC. — Azn. BSBF 44: 177. — Fritsch 248. — E: (Azn.), Orta-köj. — A: (Azn.), Kütschük-Gök-Su.
- Athyrium Filix femina* (L) Roth — Azn. BSBF 44: 177. — E.
- Nephrodium Filix mas* (L) Rich. — Azn. BSBF 44: 177. — Fritsch 248 (als *Aspidium Filix mas* / L. / Sw.). — E: (Azn.). — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.
- N. spinulosum* (Müll.) Stempel ssp. *dilatatum* (Hoffm.) Hay. — Azn. MBL 12: 185. — A: Alemdagh — Adam-Pol, rare (Azn.)
- Polystichum setigerum* (Forsk.) Woynar — Fritsch 248 (als *Aspidium aculeatum* / L. / Schott). — E: Belgrader Wald. — A: Anatol-Hissar.

Gymnospermae.

Cupressaceae.

- Juniperus oxycedrus* L. — Azn. MBL 12: 185. — Beg. 219. — H. M. 144. — A: Prinkipo (Nemetz, Beg., H. M.). Dschamlidscha, Pendik.
- J. communis* L. ssp. *nana* (Willd.) Hay. — A: Bithynischer Olymp, 2200 m.
- Cupressus sempervirens* L. — Beg. 219. — E: Orta - Köj. — A: Prinkipo (Beg.).

Abietaceae.

- Abies Bornmülleriana* Mattf. — A: Bithynischer Olymp, über 2000 m.
- Pinus brutia* Ten. — Beg. (als *P. Pithyusa* Strangw.) 219. H. M. 143. — A: Prinkipo (Nemetz, Beg., H. M.).
- P. Pallasiana* Lamb., Descr. Pin., Ed. 2, I. 11, T. 5. — A: Bithynischer Olymp, 2100 m.

Ephedraceae.

- Ephedra campylopoda* C. A. Mey. — Azn. MBL 12: 185. — A: Anatol-Hissar (Azn.).

Angiospermae.

Betulaceae.

- Betula pendula* Roth. — Von Krause 3: 181 für die europäische Türkei nicht angegeben. — E: Dschendere.
- Alnus glutinosa* (L) Gärtn. — Krause 3: 182. — E: Belgrader Wald zw. Dschendere und Bagdsche-Köj.
- Carpinus Betulus* L. — Azn. (var. *serrata* Beck) 5: 167; 12; 179. — Krause 3: 179. — E: Sekerie-Köj (Azn.), Bagdsche-Köj, Dschendere — A: Adampol (Azn.), Alem-Dagh.
- Carpinus orientalis* Mill. — Krause 3: 179.
- Corylus avellana* L. — Krause 3: 181. — E: Pyrgos. — A: Bithynischer Olymp, über 1000 m.
- C. Colurna* L. — Krause 3: 181.

Fagaceae.

- Fagus orientalis* Lipsky — Krause 3: 183. A: Bithynischer Olymp, 1000 m; Alem-Dagh.
- Castanea sativa* Mill. — Azn. 12: 179. — Krause 3: 184. — E: Belgrad (Azn.), Belgrader Wald bei Bagdsche-Köj. — A: Alem-Dagh (Azn.).
- Quercus¹⁾ armeniaca* Kotschy — Schwarz ap. Krause 3: 843.
- Q. cerris* L. — Azn. MBL 5: 167. — Schwarz ap. Krause (ssp. *austriaca* [Willd.]) 3: 840. — A: Alem-Dagh (Azn.).
- Q. coccifera* L. — Azn. MBL 5: 167. — Beg. 219. — H.M. 146. — Schwarz ap. Krause 3: 837. — E: Konstantinopel (W. 206). — A: Kartal, Beikos, Tschengel-Köj, Tusla, Prinkipo (Beg., H.M.)
- Q. Daleschampii* Ten. (= *Q. aurea* Wierzb.) — Schwarz ap. Krause 3: 847. — A: Bithynischer Olymp.
- Q. dschorochensis* C. Koch. — Schwarz ap. Krause 3: 846.
- Q. dschorochensis* × *pedunculiflora* — Schwarz ap. Krause 3: 850.
- Q. dschorochensis* × *pubescens* Schwarz ap. Krause 3: 850.
- Q. Frainetto* Ten.²⁾ (= *Q. conferta* Kit.) — Azn. (als *Q. conferta* Kit.) 5: 166. — Schwarz ap. Krause (als *Q. conferta* Kit.) 3: 844. — E: Domusdere (Azn.), Kilia (Azn.), Belgrader Wald und Dschendere (darauf Gallen von *Neuroterus lenticularis* Oliv., *Dryophanta folii* L. und *Cynips argentea* Gir.) — A: Büyük-Gök-Su (Galle von *Dryophanta pubescens* Mayr).
- Q. Frainetto* × *pubescens* — Schwarz ap. Krause (als *Q. conferta* × *pubescens*) 3: 850.
- Q. Frainetto* × *pedunculiflora* — A: Beikos, Wald.
- Q. iberica* Stev. — Krause 3: 843.
- Q. Ilex* L. Krause 3: 842. — A: Büyük-Gök-Su.
- Q. infectoria* Oliv. ssp. *Boissieri* (Reut.) O. Schwarz — Azn. MBL 12: 179. — Schwarz ap. Krause 3: 848. — E: Zw. Yenimahalle und Rumeli Karaghi (Azn.).
- Q. infectoria* Oliv. ssp. *glabrescens* O. Schwarz. — A: Kütschük-Gök-Su.
- Q. infectoria* Oliv. ssp. *puberula* O. Schwarz ap. Krause 3: 849. — E: Küjük-Dere. — A: Beikos, Bithynischer Olymp 1000 m. Messaburnu. — Ein Exemplar von Beikos sehr unentwickelt, vielleicht von *Q. pedunculiflora* beeinflußt. (O. Schwarz).
- Q. infectoria* × *pedunculiflora*. — E: Orta-Köj. — A: Beikos.
- Q. infectoria* × *polycarpa*. — E: Belgrader Wald.
- Q. lanuginosa* Thunill. — Schwarz ap. Krause 3: 847.
- Q. pedunculiflora* C. Koch — Schwarz ap. Krause 3: 845. — *Q. haas* Kotschy var. *atrichoclados* Borb. & Bornm. — Azn. BSBF 12: 179 — Bornm. 31. E: Zekerie-Köj. (Azn.), Skumru-Köj. (Azn.); Belgrader Wald (Azn., Bornm.). Dschendere (Wald von Belgrad), A: Dschamlidscha bei Skutari, Beikos, Büyük-Gök-Su.
- Q. polycarpa* Schur. — E: Rumeli Hissar. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.

¹⁾ Die von Nemetz gesammelten Eichen wurden von O. Schwarz, Berlin, bestimmt.

²⁾ Über die Nomenklatur dieser Art vergl. O. Schwarz ap. Redinger fil. in Beih. Bot. Centrbl. 54, Abt. B: 674 (1936).

Salicaceae.

Populus alba L. — Krause 3: 157.

Populus nigra L. — Azn. BSBF 44: 174. — Krause 3: 158.

P. tremula L. — Krause 3: 158.

Salix alba L. — Görz ap. Krause 3: 163.

S. alba × *fragilis* — Görz ap. Krause 3: 165. — E: Kiat-Hane.

S. cinerea L. — Görz ap. Krause 3: 167.

S. nigricans Fries. — Azn. BSBF 44: 174 — A: Das Vorkommen dieser Art im Gebiet ist durchaus unwahrscheinlich.

S. purpurea L. var. *eu-purpurea* Hay. — Görz ap. Krause 3: 176.

S. viminalis L. — Görz ap. Krause 3: 175.

Cannabaceae.

Humulus Lupulus L. — E: Rumeli-Fanar; Dschendere (Belgrader Wald).

Ulmaceae.

Ulmus foliacea (L. p. p.) Gilib. — E: Rumeli-Hissar, als Alleebaum.

— mit var. *suberosa* (Mnch.) C. K. Schneider — Krause 3: 185.

Celtis australis L. — Krause 3: 186.

Moraceae.

Ficus carica L. — Azn. MBL 12: 178 (var. *riparum* Hausskn.) — Deg. 45: 68 — E: Schirebei (Azn.), Symplegiaden (Deg.)

Urticaceae.

Urtica dioica L. — E: Konstantinopel, Stadtmauer; Orta-Köj.

U. membranacea Poir — Azn. BSBF 44: 174.

U. pilulifera L. — E: Konstantinopel, Stadtmauer (Nemetz, W. 221) Hass-Köj.

U. urens L. — E: Schischli.

Parietaria vulgaris Hill. — Beg. 220. [als *P. officinalis* L. ssp. *judaica* L] v. *ramiflora* [Mnch.] — Degen 45: 68 (als *P. diffusa* M. K.). — E: Konstantinopel: San Stefano; Wege in der Stadt. — A: Prinkipo (Beg.). Brussa. — Symplegiaden (Degen).

Santalaceae.

Osyris alba L. — Krause 3: 498. — E: Belgrader Wald, Orta-Köj, Schischli. — A: Brussa.

Comandra elegans Rchb. — Azn. BSBF 44: 174. — A.

Thesium divaricatum Jan var. *expansum* Boiss. & Heldr. — A: Dschamlidscha, Aidos-Dagh bei Kartal.

T. humile Vahl — Azn. BSBF 44: 174. — A.

Loranthaceae.

Arceuthobium Oxycedri M. B. — Azn. MBL 5: 160. — E: Auf *Juniperus macrocarpa* bei Domus-Dere (Azn.).

Viscum album L. — Azn. BSBF 44: 174. E.

Polygonaceae.

- Rumex Acetosella* L. — E: Konstantinopel (W 201). — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.
- Rumex bucephalophorus* L. — E: Schischli, Orta-Köj Dschendere.
- R. conglomeratus* Murr. — A: Beikos, im Walde.
- R. crispus* L. — Azn. BSBF 44: 174 — E.
- R. nepalensis* Spr. — Bithynischer Olymp (Aucher-Eloy Nr. 2579, Hb. Paris).
- R. pulcher* L. ssp. *eu-puleher* Rech. fil. Beih. Bot. Centrbl. 49: II. 26 (1932). — E: Schischli.
- R. sanguineus* L. — Azn. BSBF 46: 148. — E: Sariger; Zekerie-Köj (Azn.).
- R. tuberosus* L. — E: Konstantinopel (W 202). — A: Bithynischer Olymp, Wiese beim Plateau Jailleschi, 1000 m; Beikos.
- Polygonum aviculare* L. — Azn. MBL 12: 178 und BSBF 44 (als *P. littorale* Lk). — Beg. 220 (als var. *depressum* Meisn.) — E: (Azn.). — A: (Azn.); Prinkipo (Beg.).
- P. Hydropiper* L. — E: Belgrader Wald b. Dschendere.
- P. Kitaibelianum* Sadl. — Azn. BSBF 44: 174 (als *P. Bellardi* Rchb.) — E: (Azn.), Konstantinopel (W 207).
- P. lapathifolium* L. — Azn. MBL 5: 159 (ssp. *tomentosum* / Schrk. / Hay. als var.) — und BSBF 44: 174 (var. *nodosum* / Pers. / Günth., Grab., Wimm. als Art). — E: (Azn.). — A: Kanlidscha (Azn.).
- P. longipes* Hal. & Charr. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- P. maritimum* L. — Azn. BSBF 44: 174. — Degen 45: 68. — E: (Azn.), Kütschük-Tscheckmedsche. — A: (Azn.), Haidar-Pascha.
- Fagopyrum Convolvulus* (L) H. Gross — Azn. BSBF 44: 174 (als *Polygonum* C. L.) — E: (Azn.). — A: (Azn.), Riva, Düne.

Platanaceae.

- Platanus orientalis* L. — E: Konstantinopel (W 227). — A: Kütschük-Gök-Su, Anatol-Hissar; Tusla.

Euphorbiaceae.

- Chrozophora tinctoria* (L) Raf. — Azn. BSBF 44: 174. — Beg. 220. — E: (Azn.). — A: (Azn.), Prinkipo (Beg.); Antigoni (W 107).
- Mercurialis annua* L. — E: Orta-Köj. A. Brussa, Spitalberg.
- M. perennis* L. — A: Bithynischer Olymp, Laubwald bei Ak-Dschellan.
- Euphorbia aleppica* L. — Azn. MBL 12: 178. — E: Makri-Köj, San Stefano, Floria (Azn.).
- E. amygdaloïdes* L. — Azn. MBL 12: 178. — E: Belgrader Wald, Bagdsche-Köj. — Dadsch-Delen bei Armeni-Köj.
- E. biglandulosa* Desf. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
- E. chamaesyce* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.), Konstantinopel (W 223).
- E. cibyrensis* Boiss. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- E. exigua* L. — E: San Stefano; zwischen Schischli und Kiat-Hane; Konstantinopel (W 224). — A: Pendik, Dschamlidscha.
- E. falcata* L. — Azn. BSBF 44: 174. E: (Azn.); San Stefano, ausgetrockneter Sumpf. — A: (Azn.).

- E. glareosa* M. B. — Azn. MBL 5: 160 (mit var. *lasiocarpa* Boiss.) — E: Zwischen Floria und Makri-Köj (Azn.); San Stefano, Bahndamm.
- E. graeca* Boiss. & Sprun. — Azn. BSBF 44: 174 — E, A.
- E. helioscopia* L. — E: Zekerie-Köj; Schischli.
- E. humifusa* Willd. — H. M. 148. — A: Prinkipo (H. M.).
- E. lucida* W. K. var. *latisfolia* Wimm. Grab. — Azn. MBL 5: 160. — E: Ufer des Seimen-Deressi (Azn.).
- E. Niciçiana* Borb. — conf. Rech. fil. Ann. Nat. Mus. Wien 43: 331 (1929). — A: Alem-Dagh; Kartal; Armeni-Köj.
- E. oblongata* Gris. — Azn. MBL 12: 178. — A: Anadolu-Hissar (Azn.); Josua-Dagh bei Beikos.
- E. Paralias* L. — Azn. BSBF 44: 174. — Degen 45: 68. — E: (Azn.); Kütschük-Tschechkedsche; Jum-Burnu; Floria (W 225). — A: (Azn.); Riva (Degen).
- E. peplis* L. — Azn. BSBF 44: 174. — H. M. 148. — E: (Azn.). A: Prinkipo (H. M.).
- E. peplus* L. — Beg. 220. — E: Konstantinopel; zwischen Schischli und Kiat-Hane. — A: Prinkipo (Beg.).
- E. platyphyllus* L. — E: Zekerie - Köj, „Wüste“; Kiat-Hane; Konstantinopel (W 226). — A: Sultan-Tschiflik bei Beikos; Kütschük-Gök-Su.
- E. platyphyllus* L. var. *literata* (Jacq.) Rchb. — E: San Stefano, ausgetrockneter Sumpf. — A: Feuerberg.
- E. pubescens* Vahl — Azn. BSBF 44: 174 — E, A.
- E. stricta* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- E. terracina* L. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
- Andrachne telephiooides* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E, A.

Chenopodiaceae.

- Beta maritima* L. — E: San Stefano, am Strand. — A: Böyük-Gök-Su.
- Chenopodium hybridum* L. — Azn. BSBF 46: 148. — E: Konstantinopel (Azn.); Kilia (Azn.).
- C. opulifolium* Schrad. — Azn. BSBF 46: 148. — A: Kadiköj und Kartal (Azn.).
- C. Vulvaria* L. — E: San Stefano, Schutt.
- Atriplex Halimus* L. — Azn. MBL 12: 178. — A: Prinkipo, Oxya (Azn.).
- A. hastata* L. — Azn. BSBF 44: 174. — Beg. 220 (var. *triangulare*/W.). — E: (Azn.). — A: Prinkipo (Beg.).
- A. patula* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- A. portulacoides* L. — E: San Stefano, sumpfiges Meeresufer.
- A. rosea* L. — Beg. 220. — A: Prinkipo (Beg.).
- A. tatarica* L. — Azn. MBL 12: 178. — H. M. 148. — A: Zwischen Maltepe und Kartal (Azn.); Prinkipo (H. M.).
- Halocnemum strobilaceum* M. B. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.); San Stefano, sumpfiges Meeresufer.
- Salicornia fruticosa* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.); San Stefano, sumpfiges Meeresufer.
- S. herbacea* L. — Azn. BSBF 44: 174.
- Suaeda maritima* Dumort. — Azn. BSBF 44: 174. — E, A.

- Salsola Kali* L. — Beg. 220 (var. *Tragus* /L/). — E: Kütschük-Tschekmedsche. — A: Prinkipo (Beg.).
S. Soda L. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.); San Stefano (unentwickelte Pflanzen, daher fraglich).

Amarantaceae.

- Amaranthus angustifolius* Lam. var. *silvester* (Vill.) Thell. — Azn. BSBF 44: 174 (als Art). — E, A.
A. deflexus L. — Azn. MBL 12: 178. — E: Kossum-Pascha; Pera; Jeni-Köj (sämtl. Azn.). — A: Prinkipo (Azn.).
A. lividus L. var. *adscendens* (Lois.) Thell. — Azn. BSBF 44: 174 (als *Albersia Blitum* Kunth). — E.
A. retroflexus L. — Azn. MBL 12: 178. — Beg. 220. — E: Jeni-Mahalle und Therapia (Azn.). — A: Pascha-Bagdsche (Azn.); Prinkipo (Beg.).

Thelygonaceae.

- Thelygonum cynocrambe* L. — A: Pendik.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca decandra* L. — E: Orta-Köj, Feldraine.

Portulacaceae.

- Portulaca oleracea* L. — Azn. MBL 12: 160. — Beg. 220. — E: Therapia (Azn.). — A: Prinkipo (Beg.).

Caryophyllaceae.

- Herniaria cinerea* DC. — Azn. MBL 2: 143. — E: Zwischen Schischli und Kiathané-Köj (Azn.).
H. hirsuta L. — A: Beikos, Josua-Dagh; Antigoni (W 276).
H. ineana Lam. — Azn. BSBF 44: 166. — E: Schischli (var. *Besseri* / Fisch. / Gürke). — A: (Azn.).
Polycarpon tetraphyllum L. f. — Azn. BSBF 44: 166. — Degen 45: 68. — A, E: (Azn.). — Symplegiaden (Degen).
Spergularia atheniensis (Heldr. & Sart.) Asch. & Schweinf.? — A: Antigoni (W 105).
S. diandra (Guss.) Heldr. & Sart. — Azn. MBL 12: 160. — E: Konstantinopel (Azn.); Hass-Köj.
S. marginata (DC) Kittel — Azn. MBL 12: 160. — A: Pendik (Azn.).
S. rubra (L.) Pers. — Bornm. 32. — E: Wald von Belgrad (Bornm.); Kütschük-Tschekmedsche; Konstantinopel (W 106).
S. rubra (L.) Pers. var. *alpina* (Boiss.) Willk. & Lge. — Azn. BSBF 44: 166 (als var. *stipularis* Boiss.) — E: (Azn.); Bagdsche-Köj (niederer Standort!).
S. salina J. & C. Presl. — Azn. MBL 12: 160. — E: Silihdar-agha (Azn.); Böyük-Dere, Kalender (var. *sperguloides*/Lehm./Gürke — Azn.). — A: Maltepe (var. *heterosperma*/Guss./Gürke — Azn.); Vani-Köj; Prinkipo (var. *sperguloides* / Lehm. / Gürke — Azn.).
Spergula arvensis L. — E: Dschendere.
S. pentandra L. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.); Dschendere; Feri-Köj.

- Scleranthus annuus* L. — A: Brussa, sonniges Flußufer.
S. annuus L. ssp. *polycarpus* (Torn.) Thell. — Azn. BSBF 44: 166
 (als *S. verticillatus* Tausch) — E.
S. perennis L. — E: Schischli, A: Brussa, sonniges Flußufer.
Queria hispanica L. — Azn. BSBF 44: 166. — A.
Minuartia hirsuta (M. B.) H. M. ssp. *falcata* (Gris.) Mattf. var. *denu-data* (Fenzl) Gräbn. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m, Wiese.
Minuartia mediterranea (Led.) K. Maly — Azn. BSBF 44: 166 (als *Alsine tenuifolia* Cr. var. *mucronata* Boiss.) — E.
Arenaria leptoclados Guss. f. *viscidula* (Rouy & Fouc.) Will. — A:
 Brussa, Spitalberg und sonniges Flußufer.
A. serpyllifolia L. — Azn. BSBF 44: 166. — E, A.
Sagina apetala L. — E: Kütschük - Tschekmedsche. — A: Brussa,
 Spitalberg; Beikos, Josua-Dagh.
S. ciliata Fr. — Azn. MBL 12: 160. — E: Orta-Dscheschme; Agaz-Pascha. (Azn.).
S. maritima Don. — Azn. MBL 12: 166. — A: Prinkipo (Azn.).
Moenchia erecta (L.) G. M. Sch. — Azn. BSBF 44: 166 (als *M. quaternella* Ehrh.) — E.
M. manatica (Torn.) Bartl. — Azn. BSBF 44: 166 (var. *violascens*
 Azn.). — Bornm. 32. E: (Azn.); Böyük-Dere; Dschendere; Kiat-Hane;
 Belgrader Wald (Nemetz, Bornm.). — A: Bithynischer Olymp 1000 m und 2000 m; Beikos.
Cerastium anomatum W. K. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.);
 Kiat - Hane; Konstantinopel (W 271). — A; (Azn. — var.
glabrescens Azn.).
C. brachypetalum Desp. — Azn. BSBF 44: 166. A.
C. illyricum Arduin — E: Konstantinopel (W 272).
C. luridum Guss. ssp. *Gussonei* Lonsing ined. — det. Lonsing. —
 A: Bithynischer Olymp, 1000 m, Wiese.
C. pentaedrum L. det. Möschl. — A: Brussa, sonniges Flußufer.
C. pumilum Curt. f. *typicum* Beck — det. Möschl. — Hierher vielleicht
 auch Azn. BSBF 44: 166 (*C. alsinoides* Lois.). — A. — E; Kütschük-Tschekmedsche.
C. semidecandrum L. — Azn. BSBF 44: 166. — A.
C. tetrandrum Curt. — Azn. BSBF 44: 166. — E.
C. viscosum L. (= *C. glomeratum* Thuill.). — det. Lonsing. — E;
 Schischli; Kiat-Hane.
Myosoton aquaticum L. — Azn. BSBF 44: 166 (als *Malachium a.*
 Fries.). — E, A (typ. und var. *orientalis* Vel.).
Stellaria holostea L. — Azn. BSBF 44: 166; MBL 1: 301 (monstr.
phaeanthera Azn.); MBL 12; 160 (f. *bisbifida* Azn.). — E; (Azn.);
 Wald von Belgrad; Böyük-Dere (Nemetz, Azn. — f. *bisbifida*);
 Sultan-Suju (Azn. — f. *bisbifida*); Kilidschbunar (Azn.); Kütschük-Skumru-Köj (Azn.); Zekerie-Köj (Azn. — m. *phaeanthera*). —
 A; Beikos.
S. media Vill. — Azn. BSBF 44: 166, typ. — E, A. — subvar. *glaberrima*
 Azn. — A. — var. *apetala* Boiss. subvar. *glaberrima* Azn. E: (Azn.);
 San Stefano, Bahndamm; Kiat-Hane; Orta-Köj; Böyük-Dere. —
 A; Tusla; Pendik (mit subvar. *glaberrima*).

- Saponaria officinalis* L. — Azn. MBL 12: 159. — E: Kütschük-Tschekmedsche (Azn.). — A: Göksu (Azn.); Böyük-Gök-Su (f. *hirsuta* Wierzb.)
- Vaccaria pyramidata* Med. ssp. *grandiflora* (Fisch.) Hay. — Azn. MBL 12: 159 (als *Saponaria Vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch.). — E: San Stefano; Safra-Köj; Yerliköj. — A: Kalamisch. (Sämtliche Azn.).
- Gypsophila porrigens* (L.) Boiss. — Azn. MBL 12: 159. — E: Schischli (Azn.) — A: Pendik (Azn.).
- Kohlrauschia velutina* (Guss.) Rchb. — Azn. MBL 1: 301 als *Tunica* v. Fisch. & Mey). — E: Bagdsche-Köj (Azn. typ. mit f. *levicaulis* Rouy & Fouc.); Dschendere, Wald von Belgrad; Kilia; Rumeli-Fanar. — A: Wald bei Beikos; Brussa, sonniges Flußufer (z. T. f. *levicaulis*; — ? Messarburnu.
- Dianthus¹⁾ glutinosus* Boiss. u. Heldr. — A: Dschamlidscha, Böyük-Gök-Su, Teichufer; Alem-Dagh; Aidos-Dagh bei Kartal.
- D. lydus* Boiss. — Azn. MBL 12: 159. — A: Maltepe; Soghanli (Azn.).
- D. pallens* Sibth. — Azn. MBL 12: 159. (var. *oxylepis* Boiss.). — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane-Köj (Azn.). — A: Dschamlidscha bei Skutari; Prinkipo (Azn.).
- D. pinifolius* Sibth. & Sm. ssp. *lilacinus* (Boiss. u. Heldr.) Wettst. — Azn. MBL 1: 300 (als Art). — A: Kaisch-Dagh bei Erenköj (Azn.).
- D. tureicus* Vel. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.). — A: Aidos-Dagh.
- Velexia rigida* L. — E: Orta-Köj.
- Silene colorata* Poir. — E: Kütschük-Tschekmedsche.
- S. compacta* Fisch. — Azn. MBL 12: 159. — E: Sariger; Tschinartcheschmessi. — A: Dschamlidscha; Karabasch-Tepe; Prinkipo (sämtlich Azn.); Yakadschik-Dagh (W 273).
- S. conica* L. — Azn. MBL 1: 301. — E: Domusdere (Azn.). — A: Pendik (Azn.); Brussa, sonniges Flußufer.
- S. cretica* L. — Azn. BSBF 44: 166. — E.
- S. dichotoma* Ehrh. ssp. *eu-dichotoma* Hay. — E: Therapia.
- S. dichotoma* Ehrh. ssp. *racemosa* (Otth) Hay. — E: Kilia, Düne; Domusdere, Düne. — A: Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan, Gebüsch.
- S. gallica* L. — Azn. BSBF 44: 166 (var. *quinquevulnera* / L. / M. K.; als Art). — E: (Azn. — var. *quinquevulnera*); Dschendere; Konstantinopel (W 274). — A: Brussa.
- S. italica* (L.) Pers. — Azn. BSBF 44: 166. — E, A.
- S. nocturna* L. var. *byzantina* Azn. — Azn. BSBF 46: 139. — A: Halki (häufig); Pendik (selten). — (Sämtlich Azn.).
- S. Otites* (L.) Sm. — Azn. BSBF 44: 166. — E.
- S. thymifolia* Sibth. & Sm. — E: Kilia, Düne.
- S. vulgaris* (Mnch.) Gcke. — E: Kilia, Düne; Jedi-Kule.
- S. vulgaris* (Mnch.) Gcke. ssp. *commutata* (Guss.) Hay. — E: Jedi-Kule, Feldraine. — A: Brussa, Weg zu den Bädern.
- Melandrium album* (Mill.) Gcke. ssp. *eriocalycinum* (Boiss.) Hay. — Azn. MBL 1: 293 als *M. eriocalycinum* Boiss. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Pendik, Bahndamm.

¹⁾ Vergleiche: Stojanoff u. Adtaroff: Kritische Studien über die Nelken Bulgariens. Sbornik bulg. Akad. nauk. 229 (1935).

Agrostemma Githago L. — Azn. BSBF 44: 160 (als *Githago segetum* Desf.). — E: (Azn.); Zekerie-Köj, Felder. — A: Brussa, sonniges Flußufer.

Lauraceae.

Laurus nobilis L. — Krause 3: 503. — H. M. 154 — E: Rumeli-Hissar. — A: Prinkipo (H. M.).

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L. — E: Kütschük-Tschekmedsche, Wassergraben. — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.

A. rotunda L. var. *aegaea* Gris. — A: Aidos-Dagh; Beikos, Laubwald. — Die Blattstiele sind länger als bei dalmatinischen Exemplaren des Typus, etwa so lang wie die Blütenstiele.

Rafflesiaceae.

Cytinus Hypocistis L. ssp. *Kermesinus* Guss. — A: Beikos.

Berberidaceae.

Epimedium pubigerum Morr. & Dec. — Krause 2: 21. — Bornm. 33. — E: Dschendere; Bujuk-Dere; Wald von Belgrad (Bornm.); europäisches Ufer des Bosporus (Krause). — A: Beikos, Josua-Dagh.

Leontice leontopetalum L. — Azn. BSBF 44: 165. — E.

Ranunculaceae.

Helleborus orientalis Lam. var. *hirsutus* (Schiffn.) Hay. — Als *H. Kochii* Schiffn.: Krause 2: 23; Bornm. 33; Deg. ÖBZ 42: 365. — E: Domusdere, Gebüsch; Wald von Belgrad (Bornm.); Abhänge vom Bosporus gegen das Schwarze Meer (Deg.); Konstantinopel (W 246.); ? Messarburnu, Gebüsch.

Nigella arvensis L. var. *glauca* Boiss. — Azn. MBL 12: 157 (als *N. tuberculata* Gris.) — E: Jedikule; Makriköj; San Stefano; Floria (W. 103); Safranköj. — A: Erenköj; Kartal. (Sämtlich Azn.)

N. damascena L. — E: Zekerie-Köj; San Stefano. — A: Skutari, Felder.

N. elata Boiss. — Azn. MBL 1: 297 (BSBF 44: 165 — als *N. bithynica* Azn.). — A: Kartal (Azn.)

N. sativa L. var. *hispida* Boiss. — Azn. BSBF 44: 165 (als var. *brachyloba* Boiss.). — E.

Delphinium peregrinum L. var. *eriocarpum* Boiss. — Azn. BSBF 44: 165. — E: (Azn.); San Stefano. — A: (Azn.).

Consolida Ajacis (L.) Schur. — Azn. BSBF 46: 137 (als *Delphinium A. L.*). — E: Zwischen Kilia und Domus-Dere (Azn.).

C. orientalis (Gay) Schrödg. — Azn. MBL 1: 298 (als *Delphinium o. Gay*). — E: San Stefano; Mandra (Azn.).

C. regalis S. F. Gray ssp. *paniculata* (Host) Soó. — Azn. MBL 12: 157 (als *Delphinium paniculatum* Host). — E: Jedikule; Makriköj; San Stefano; Safraköj; Halkali (sämtlich Azn.).

Anemone coronaria L. — A: Tusla.

- A. hortensis* L. var. *pavonina* (Lam.) Gr. Godr. subvar. *fulgens* (DC) Hay. — E: Zwischen Kiat-Hane und Feri-Köj; zwischen Schischli und Dschendere.
- A. hortensis* L. var. *pavonina* subvar. *purpureo-violacea* Boiss. — E: Kiat-Hane; Kütschük-Tschekmedsche. — A: Feuerberg (= Kenan-tepe).
- Clematis cirrhosa* L. — Krause 3: 502. — A: Insel Antigoni; Pendik; Armeni-Köj.
- C. recta* L. — Krause 3: 501.
- C. vitalba* L. — Krause 3: 500. — E: Orta-Köj. — ? Bosporus (W 245).
- C. viticella* L. — Azn. BSBF 44: 165. — Krause 3: 502. — A: (Azn.); Aidos-Dagh bei Kartal; Armeni-Köj.
- Thalictrum lucidum* L. f. *heterophyllum* (Wimm. & Gr.) Hay. — Azn. BSBF 46: 135 (als *T. angustifolium* Jacq. var. *heterophyllum* Wimm. & Gr.). — E: Tschekmedsche (Azn.); Domusdere (Azn.); Kilia, Bachufer; Konstantinopel (W 244). — A: Alem-Dagh (Azn.).
- Ficaria verna* Huds. ssp. *grandiflora* (Rob.) Hay. — E: Orta-Köj; Therapia; Dschendere. — A: Kütschük-Gök-Su; Feuerberg (= Kenan-tepe).
- Ranunculus aquatilis* L. — E: San Stefano.
- R. arvensis* L. — Azn. BSBF 44: 165. — E: (Azn. var. *tuberculatus* DC); Konstantinopel (W 243). — A: Tusla; Kartal.
- R. Baudotii* Godr. var. *submersus* G. & G. — Bornm. 31. — E: Wald von Belgrad (Bornm.).
- R. chaerophyllus* L. f. *granulatus* (Gris.) Hay. — Bornm. 31 (als *R. Agerii* Bert. var. *granulatus* (Gris.) — E: Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Kaisch-Dagh.
- R. chius* DC. — Azn BSBF 44: 165. — E: (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche (Zwergform). — A: (Azn.).
- R. constantinopolitanus* Urv. — Bornm. 31. — Degen 41: 232. — E: Wald von Belgrad (Bornm.); Ufer des Bosporus (Degen); Kiat-Hane; San Stefano. — A: Anatol-Hissar; Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- R. eriophyllum* C. Koch — Azn. BSBF 46: 135. — E: Kiat-Hane, Wiese (Azn., Nemetz); Balta-Liman (Azn.). — A: Insel Antigoni (Azn.).
- R. falcatus* L. — Azn. BSBF 44: 165 (als *Ceratocephalus* f. Pers.). — E.
- R. fibrillosus* C. Koch. — A: Bithynischer Olymp 2200 m. — Die Exemplare entsprechen der *f. minor* Bornm., Iter anatomicum tert. (1899) in sched.
- R. flabellatus* Desf. — E: Dschendere; Schischli.
- R. lateriflorus* DC. — Azn. nach Wimmer, Manuskr. — E.
- R. marginatus* Urv. var. *levis* Azn. — Azn. MBL 1: 293 ff. — E: Halkali; San Stefano; Kiat-Hane. — A: Alem-Dagh. (Sämtlich Azn.).
- R. marginatus* Urv. var. *transiens* Azn. — Azn. MBL 1: 293 ff. — E: Jedi-Kule. — A: Maltepe. (Sämtlich Azn.).
- R. marginatus* Urv. var. *trachycarpus* (F. & M.) Azn. — Azn. MBL 1: 293 ff. BSBF 46: 136 (als Art.). — E: Schischli (Azn.); Halkali (Azn.); Böyük-Dere (Azn.); Jedi-Kule. — A: Eren-Köj (Azn.).
- R. muricatus* L. — Azn. BSBF 46: 136. (typ.) E, A.

- R. muricatus* L. var. *graecus* Heldr. & Sart. (= *R. graecus* Gris.). — Azn. (nach Wimmer, Manuskr.) — E: Pera; Kadiköj. — A: Prinkipo; Halki; Maltepe. (Sämtlich Azn.).
- R. neapolitanus* Ten. — Azn. MBL 1: 293. — E: Dschirdschirsu (typ.); — Topdschilar; Kiat-Hane; Halkali (die drei letzteren f. *villosa* Freyn). — A: Insel Antigoni (f. *villosa* Freyn). (Sämtlich Azn.).
- R. ophioglossifolius* Vill. var. *byzantinus* Azn. — Azn. BSBF 46: 136. — Bornm. 31. — E: Wald von Belgrad (Bornm. „var.“?). — A: Maltepe (Azn.).
- R. paucistamineus* Tausch. — A: Tusla. — Auf diese Art dürfte sich die Angabe von *R. conservoides* Fries bei Azn. BSBF 44: 165 beziehen.
- R. thracicus* Azn. — BSBF 44: 136. — E: Belgrad-Köj, am Böyük-Bend (Azn.). — A: Dorf Alem-Dagh (Azn.).
- Adonis autumnalis* L. — E: Domusdere.
- A. autumnalis* L. var. *Preslii* (Tod.) Hay. — Azn. BSBF. 46: 135 (als Art). — E: San Stefano; Topdschilar. — A: Erenköj. (Sämtlich Azn.).
- A. flammea* Jacq. — Azn. BSBF 44: 165. — E: (Azn.). — A: Brussa, sonniges Flusufer; Pendik, Bahndamm.

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum (L.) Smith. — E: Dschendere, Kiat-Hane-Su.

Papaveraceae.

- Chelidonium majus* L. f. *hypotrichum* Azn. — Azn. BSBF 46: 137. — E: Kestane-Suju bei Sariger (Azn.). — A: Böyük-Gök-Su (Azn.); Bithynischer Olymp, am Weg nach Ak-Dschellan.
- Glaucium corniculatum* (L.) Curt. f. *tricolor* (Bernh.) Ledeb. — Azn. BSBF 46: 137 (MBL 1: 298 als var. *aurantiacum* Rouy & Fouc.). — E: Schischli. — A: Prinkipo; Aidischli-Tal. (Sämtlich Azn.).
- G. flavum* Cr. — Azn. BSBF 44: 165. — Degen 45: 68. — E: (Azn. typ.); Rumeli-Fanar, Felsen am Meer. — A: (Azn. var. *glabratum* Willk. & Lge.); Riva (Degen).
- Roemeria hybrida* (L.) DC. — Azn. BSBF 44: 165. — E.
- Papaver dubium* L. — A: Tusla, Feldränder.
- Papaver hybridum* L. — A: Kartal; Tusla; Antigoni (W 263).
- P. Rhoeas* L. — A: Antigoni (W 262).
- P. Rhoeas* L. var. *rumelicum* (Vel.) Fedde. — E: San Stefano. — A: Pendik.
- Hypecoum pendulum* L. — Azn. BSBF 46: 137. — E: San Stefano. Selten (Azn.).
- H. procumbens* L. — Azn. BSBF 44: 165. (BSBF 46: 137 var. *macropetalum* Azn.). — E: Floria (Azn.); Domus-Dere; Kütschük-Tscheckmedsche; San Stefano (W 265). — A: Pendik (Azn. var. *macropetalum*).
- Corydalis solida* (L.) Sw. — A: Bithynischer Olymp, 2200 m.
- Fumaria officinalis* L. det. Pugsley. — E: Dschendere; Kiat-Hane.
- F. officinalis* L. var. *densiflora* (DC) Parl. — Azn. BSBF 44: 165 (als *F. micrantha* Lag.). — E, A.

Capparidaceae.

Cleome aurea Čel. — Deg. ÖBZ 42: 367. — Wüste Plätze bei Beschik-Tasch (Charrell).

Cruciferae.

Sisymbrium austriacum Jacq. ssp. *thracicum* Azn. — Azn. MBL 1: 300. — E: Galataria (Azn.).

S. Loeselii L. — Beg. 220. — A: Prinkipo (Beg.).

S. orientale Torn. — Azn. BSBF 44: 165 (als *S. Columnae* Jacq.) — E: (Azn.); Konstantinopel (W 253).

Chamaepodium polyceratum (L.) Wallr. — Azn. MBL 12: 157 (als *Sisymbrium p. L.*). — E: Pera. — A: Erenköj; Pendik. (Sämtlich Azn.).

C. polyceratum (L.) Wallr. var. *confertum* (Stev.) O. E. Schulz. — Azn. BSBF 46: 137 (als *S. anomalum* Azn.) — E: Kilia; Böyük-Liman. (Sämtlich Azn.).

Erysimum graecum Boiss. & Heldr. — Azn. BSBF 44: 165. E.

E. pulchellum (Willd.) Boiss. — Azn. MBL 12: 157 (MBL 6: 7 als *E. Degenianum* Azn.). — E: Kalkhügel bei Halkali und Jarim-Burgas (Azn.).

E. repandum L. — Azn. BSBF 46: 137. — A: Prinkipo; Proti. (Sämtlich Azn.).

Syrenia cuspidata (MB.) Rchb. — Azn. BSBF 44: 165 (als *Erysimum e.* DC.). — E: (Azn.). — A: Brussa, Weg zu den Bädern.

Barbarea vulgaris R. Br. — Azn. BSBF 44: 165. E, A.

Roripa austriaca (Cr.) Bess. — Azn. BSBF 44: 165 (als *Nasturtium a.* Cr.) — E, A.

R. pyrenaica (L.) Rchb. ssp. *lippizensis* (Wulf.) Hay. — Azn. BSBF 44: 165 (als *Nasturtium lippizense* DC.). — E.

Nasturtium officinale R. Br. — E: Konstantinopel (W 259). — A: Brussa, Weg zu den Bädern.

Cardamine bulbifera (L.) Cr. — Azn. BSBF 44: 165 (als *Dentaria b.* L.). — E: (Azn.); Belgrader Wald. — A: (Azn.).

C. hirsuta L. — H. M. 27: 49. — E: Schischli; Dschendere; Süße Wasser (W 258). — A: Prinkipo (H. M.).

Arabidopsis Thaliana (L.) Schur. — H. M. 27: 49. — E: Kiat-Hane. A: Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 257).

Turritis glabra L. — Azn. BSBF 44: 165. — A.

Arabis alpina L. ssp. *caucasica* (Willd.) Briq. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m, im Gebüscht.

Alliaria officinalis Andrz. — A: Beikos, Wiesen.

Isatis arenaria Azn. f. *glabrata* Azn. — Azn. BSBF 46: 138. — E: Domus-Dere (Azn., Nemetz). — A: Riva (Azn.). f. *hirsuta* seltener (Azn.).

Bunias Erucago L. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.); Dschendere; Kiat-Hane; Schischli (f. *integrifolia* Koch). — A: (Azn.) — ? Ejub (W 252).

Cheiranthus Cheiri L. — Azn. BSBF 44: 165. — E, N.

Hesperis tristis L. — Azn. MBL 1: 300. — E: Hügel bei S. Georg (Azn.).

- Malcolmia africana* (L.) R. Br. — Azn. MBL 12: 157. — A: Pendik (Azn.).
- M. confusa* Boiss. — Azn. BSBF 44: 165. — Degen 45: 68. — E: Kilia (Azn., Nemetz); Kütschük-Tschekmedsche (Azn., Nemetz, W 266). — A: Riva (Degen).
- Matthiola tristis* (L.) R. Br. var. *thessala* (Boiss. & Orph.) Conti — Azn. MBL 1: 298. — Degen 45: 68. — E: Sanddüne zwischen Kilia und Domusdere (Azn.); Kilia, Düne; Ufer des Bosporus (Degen). — A: Jum Burnu, Sanddüne gegen Riva. — Von Hayek in Prodr. Fl. Balc. 1: 422 für Thrazien nicht angegeben.
- Berteroa obliqua* (Sibth. & Sm.) Hal. — Azn. BSBF 44: 166. — A.
- Lepidotrichnum Uechtritzianum* (Bornm.) Vel. — Azn. BSBF 44: 165. A: (Azn.); Dünensand östlich von Jum Burnu.
- Alyssum campestre* L. var. *genuinum* Azn. — Azn. MBL 12: 158. — E: Makri-Köj; Schischli; Flamur; Therapia. — A: Beylerbey; Prinkipo (Sämtlich Azn.); Feuerberg (= Kenan-tepe); Antigoni (W 256).
- A. campestre* L. var. *micropelatum* (Fisch.) Boiss. — Azn. MBL 12: 158. — A: Maltepe; Kartal; Soghenli; Pendik (Sämtlich Azn.).
- A. campestre* L. var. *microanthum* (C. A. Mey.) Boiss. — Azn. MBL 12: 158. — A: Prinkipo (Azn.).
- A. campestre* L. var. *ambiguum* Azn. — Azn. MBL 12: 158. — A: Tschengel-Köj (Azn.).
- A. minutum* Schl. — Azn. BSBF 44: 165 — E.
- A. umbellatum* Desv. — E: Kütschük-Tschekmedsche. — Die Exemplare von Kütschük-Tschekmedsche zeichnen sich vor solchen von den aegaeischen Inseln durch besonders dichte weißlich-graue Behaarung aus.
- Clypeola Jonthlaspi* L. — Azn. BSBF 44: 166. — E, A.
- C. microcarpa* Moris. — Azn. BSBF 46: 138. — E: Zwischen Domusdere und Skumruköj (Azn.).
- Draba muralis* L. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.) — A: (Azn.); Bithynischer Olymp, über 2000 m.
- Erophila Krockeri* Andrz. — H. M. 27: 52 (als *Draba Krockeri* [Andrz.] Schur). — A: Prinkipo, Strandwälder (H. M.).
- E. majuscula* Jord. — Azn. BSBF 46: 138. — E: Pera (Azn.).
- E. oblongata* (Jord.) Hay aff. — det. Wibiral. — E: Orta-Köj.
- E. praecox* (Stev.) DC. aff. (*E. spathulata* Lang aff. ?) — det. Wibiral. A: Bithynischer Olymp, 2200 m. — Ohne Früchte nicht sicher bestimmbar.
- E. radians* Rosén ? (*E. Krockeri* Andrz. aff.) — det. Wibiral. — E: Schischli; Orta-Köj.
- Diplotaxis muralis* DC. — Azn. MBL 12: 159. — E: Dolmabagdsche; Schischli; Bagdsche-Köj. (Sämtlich Azn.).
- D. tenuifolia* DC. — E: San Stefano, Bahndamm; Konstantinopel (W 254).
- D. tenuifolia* DC. var. *integrifolia* Koch. — Azn. MBL 12: 158. — E: Rumeli-Hissar (Azn.).
- Sinapis arvensis* L. — E: Konstantinopel (W 247).



- S. arvensis* L. var. *orientalis* Boiss. — Azn. BSBF 46: 139. — E: Jeniköy (Azn.); Konstantinopel (W 248).
- Hirschfeldia incana* (Jusl.) Lagrèze-Fossat. — Azn. 12: 159. — E: Schischli; Flamur; San Stefano; Jedikule (hier auch von Nemetz); Konstantinopel (W 249). — A: Bostandschik; Maltepe; Pendik. (Sämtlich Azn.).
- Cakile maritima* Scop. — Azn. BSBF 44: 166. Degen 45: 68. — H. M. 156. — E: (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche. — A: (Azn.); Riva (Degen); Prinkipo (H. M.).
- Rapistrum hispanicum* (L.) Cr. — Azn. MBL 12: 159 (als *R. Linnaeanum* Boiss. & Reut.). — A: Bostandschik; Halki (Sämtlich Azn.).
- R. rugosum* (L.) All. — E: Konstantinopel (W. 251).
- Crambe maritima* L. — Azn. BSBF 44: 166. — Degen 45: 68. — A: (Azn.); Riva (Degen).
- Calepina irregularis* (Asso) Thell. — E: Dschendere.
- Raphanus sativus* L. E: Schischli. — A: Antigoni (W 250).
- Conringia orientalis* (L.) Andrz. — Azn. MBL 1: 300. — A: Prinkipo.
- Goniolobium austriacum* (Jacq.) Beck — Azn. BSBF 44: 165 (als *Conringia* A. Andrz.) — A.
- Andrzcovskia Cardamine* Rchb. — E: Zekerie-Köj, etwas feuchte Orte.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. — A: Tusla, Felddraine; Antigoni (W. 260).
- L. graminifolium* L. — Beg. 220 (als *L. Iberis* Chaub. & Bor.). — H. M. 156. — E: Orta-Köj. — A: Prinkipo (Beg., H. M.); Antigoni (W. 261).
- L. perfoliatum* L. — Azn. BSBF 44: 166. — E.
- L. spinosum* Ard. — Azn. MBL 12: 158 (als *L. spinescens* DC). — E: Dschendere; Kiat-Hane. — A: Paliambelo (Azn.).
- Cardaria Draba* (L.) Desv. — A: Antigoni (W 255).
- Iberis acutiloba* Bert. (= *I. odorata* Boiss.) — Azn BSBF 44: 166 (als *I. odorata* L.) — E: (Azn.); San Stefano.
- Coronopus procumbens* Gilib. — E: Konstantinopel (W. 264).
- Thlaspi alliaceum* L. — Azn. BSBF 46: 138. — E: Böyükdere (Azn.).
- T. perfoliatum* L. — E: Konstantinopel (W 267). — A: Pendik.
- Teesdalia coronopifolia* (Bergeret) Thell. — E: Schischli; Kiat-Hane.
- T. nudicaulis* R. Br. — Azn. MBL 12: 158. — E: Schischli.
- Capsella rubella* Reut. — E: Konstantinopel; Schischli; Orta-Köj.
- Camelina sativa* (L.) Cr. ssp. *microcarpa* (Andrz.) Hegi. — Azn. BSBF 44: 166 (als *C. microcarpa* Andrz.). — A.
- Vogelia apiculata* (F., M. & Avé Lall.) Vierh. — Azn. MBL 1: 300 (als *Neslia Thracica* Vel.). — E: San Stefano. — A: Tusla; Pendik (Azn.); Insel Antigoni (Azn.).

Resedaceae.

- Reseda lutea* L. — Azn. MBL 12: 159. — E: Schischli; Makriköj; San Stefano; Konstantinopel (W. 233). — A: Kurbali-Dere; Erenköj (Sämtlich Azn.).
- R. lutea* L. var. *mucronulata* (Tin.) J. Müll. — E: Jedi-Kule, Felddraine; San Stefano.

B. luteola L. — Azn. MBL 12: 159. — E: Kefeli-Köj. — A: Anadolu-Karagi; Umur-Jeri (Sämtlich Azn.)

Cistaceae.

- Cistus laurifolius* L. — Bithynischer Olymp, 500 m, Gebüschen.
Cistus salviaefolius L. — Beg. 220. — E: Therapia, Sommerpalast; Böyük-Dere. — A: Prinkipo (Beg.); Antigoni (W. 29).
C. villosus L. ssp. *eu-villosus* Hay. — E: Schischli.
C. villosus L. ssp. *eu-vilosus* Hay. var. *tauricus* (Presl) Grosser. — H. M. 157 (als *C. tauricus* Presl). — E: Konstantinopel (W. 13). — A: Prinkipo (H. M.).
C. villosus L. ssp. *creticus* (L.) Cr. — E: Therapia, Böyük-Dere. — A: Antigoni (W. 16).
Tuberaria guttata (L.) Fourr. — H. M. 157 (als *T. inconspicua* [Thib.] Willk.). — E: Böyük-Dere. — A: Prinkipo (H. M.); Antigoni (W. 17).
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. *vulgare* (Lam & DC.) Hay. var. *discolor* (Rchb.) Janch. — Azn. BSBF 44: 166 (als *H. vulgare* Gärtner var. *discolor* Boiss.) — E.
H. salicifolium (L.) Mill. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Tusla, Feldraine.
Fumana arabica (Justl.) Spach — H. M. 157. — A: Prinkipo (H. M.).
F. ericoides (Cav.) Pau. — BSBF 44: 166 (als *F. Spachii* Gren. & Godr.) — E.
F. thymifolia (L.) Verl. — Azn. BSBF 44: 166 (als *F. glutinosa* Boiss. var. *viridis* Boiss.). — A.
F. vulgaris Spach. — E: Kilia.

Violaceae.

- Viola arvensis* Murr. — Azn. BSBF 46: 139 (als *V. tricolor* L. var. *arvensis* Boiss.). — E: San Stefano. — A: Kaisch-Dagh. — In diesen Formenkreis gehört auch *V. tricolor* L. var. *segetalis* Boiss. bei Azn. BSBF 46: 139 vom Tschataldag (E).
V. canina L. — E: Rumeli-Hissar; Dschendere; Böyük-Dere. — A: Dschamlidscha.
V. Kitaibeliana R. & S. — Azn. BSBF 46: 139 (als *V. tricolor* L. var. *Kitaibeliana* Boiss.) — E: Haikali; San Stefano. — A: Alemdagh; Prinkipo. (Sämtlich Azn.).
V. olympica (Gris.) — det. Fritsch. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
V. parvula Tin. — A: Bithynischer Olymp, 2100 m.
V. Ririniiana Rchb. ssp. *Sieheana* (W. Becker) Hay. — Krause 2: 235 (als *V. R. ssp. neglecta* [M. B.] W. Becker). — A: Josua-Dagh (Krause).

Tamaricaceae.

- Tamarix parviflora* DC. — A: Brussa, sonniges Flußufer; Tschengel-Köj.
T. tetrandra Pall. — Konstantinopel (W. 153).

Cucurbitaceae.

Ecballium Elaterium (L) Rich. — Azn. MBL 12: 165. — Beg. 221.
E: Konstantinopel, Stadtmauer; San Stefano, Bahndamm. —
A: Prinkipo (Beg.).

Guttiferae.

Hypericum acutum Mnch. ssp. *eu-acutum* Hay. — Azn. MBL 12: 160
(als *H. tetrapterum* Fries = *H. Borbassii* Form.).

H. bithynicum Boiss. — Degen 41: 232. — E: Ufer des Bosporus
(Degen).

H. byzantinum Azn. — E: Halkali bei Konstantinopel. — Ähnlich dem
H. leprosum Boiss., von dem es sich durch fast sitzende Blüten, ein-
fache abgerundete Kelchblätter und Drüslosigkeit unterscheidet.

H. calycinum L. — Azn. MBL 1: 302. — E: Belgrader Wald. —
A: Beikos; Bithynischer Olymp, Gebüsch bei 1000 m; Armeni-Köj.
— ? Bosporus (W 126).

H. cassium Boiss. — Azn. BSBF 46: 140. — E: Kestane-suju (Azn.).
H. confusum Vand. — E: Therapia, Sommer-Palast.

H. crispum L. — E: San Stefano, Felder gegen Floria.

H. Montbretii Spach — Degen 41: 232. — E: Dschendere, Wald; Ufer
des Bosporus (Degen). — A: Aidos-Dagh; Josua-Dagh, Wald;
Antigoni (W 127).

H. perforatum L. — Beg. 221. — E: Orta-Köj; Therapia. — A: Prinkipo
(Beg.); Antigoni (W 125). — ? Bosporus (W 79).

H. rhodopacum Friv. — A: Feuerberg bei Tschengel-Köj; Kaisch-
Dagh; Aidos-Dagh bei Pendik; Dschamlidscha; Bithynischer
Olymp, Wiese bei 1000 m. — ? Bosporus (W 78).

Malvaceae.

Hibiscus trionum L. — Azn. BSBF 44: 167. — A.

Abutilon Theophrasti Med. — Azn. BSBF 44: 167 (als *A. Avicennae*
Gärtn.) — E.

Malva montana Forsk. — Azn. BSBF 44: 167 (als *M. nicaeensis* All.)
E: (Azn.); Jedi-Kule. — A: (Azn.).

M. neglecta Wallr. — Azn. BSBF 46: 140 (als *M. rotundifolia* L.). —
E: Flamur (Azn.).

M. parviflora L. — A: Antigoni (W 210).

M. pusilla With. — Azn. MBL 1: 303 (als *M. borealis* Wallr.). —
E: Zekerie-Köj (Azn.).

M. silvestris L. — Beg. 221 (var. *eriocarpa* Boiss.). — E: Kilia; Jedi-
Kule; Dschendere, Rumeli-Fanar; Konstantinopel (W 211). —
A: Prinkipo (Beg.); Brussa, sonniges Flußufer.

Lavatera cretica L. — Azn. MBL 1: 303. — E: Galata; Flamur (Sämt-
lich Azn., f. *hirsuta* Azn.).

L. punctata All. — Azn. BSBF 44: 167. — E: (Azn.); Rumeli-Fanar.

Althaea cannabina L. Azn. MBL 12: 161. — E: Halkali (Azn.); Küt-
schük-Tschekmedsche. — A: Erenköj (Azn.); Pendik (Azn.).

- A. hirsuta* L. — Azn. BSBF 44: 167 — E, A:
A. officinalis L. — Azn. BSBF 44: 167. — E: (Azn.); Kütschük-Tschek-med sche. — A: (Azn.)
A. pallida (W. K.) Nym. — E: Rumeli-Fanar, Felsen am Meer. — A: Tschengel-Köj.
A. pontica Janka. — E: San Stefano, Bahndamm.
A. rosea (L.) Cav. — E: San Stefano, Bahndamm.
Malope malacoides L. Azn. BSBF 44: 167. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Tusla, Feldraine.

Tiliaceae.

- Tilia tomentosa* Mch. — A: Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan und bei den Bends.

Linaceae.

- Linum austriacum* L. — Azn. BABF 44: 168. — A: (Azn.); Kartal, Bahndamm. — Wegen der relativ schmalen, spitzen Sepalen wohl wirklich *L. austriacum* und nicht *L. perenne* L. Dafür spricht auch die Richtung der vorjährigen Fruchtstiele.

- L. angustifolium* Huds. — Azn. MBL 12: 141. Bornm. 32. — E: Zwischen Böyük-Dere und Bagtsche-Köj (Azn.); Wald von Belgrad (Bornm., Nemetz). — A: Alemdagh (Azn., Nemetz).

- L. bithynicum* Azn. — Azn. BSBF 44: 167. — A: Alemdagh (Azn., Nemetz); Kaisch-Dagh (Azn.); Dschamlidscha.

- L. elegans* Sprun. var. *elatius* Hal. — Azn. MBL 12: 161. — E: Zwischen Halkali und Jarim-Burgas. — A: Riva (Sämtlich Azn.).

- L. gallicum* L. — H. M. 159. — E: Therapia, Sommerpalast; Schischli, sonnige Hügel. — A: Prinkipo (H. M.).

- L. hirsutum* L. ssp. *byzantinum* Azn. BSBF 46: 140. — E: Böyük-Halkali (Azn.).

- L. nodiflorum* L. — Azn. BSBF 44: 167. — E, A.

- L. strictum* L. mit var. *spicatum* (Lam.) Pers. — Azn. BSBF 44: 167. — typ: A., var. — E: (Azn.); Konstantinopel (W 160). — A: (Azn.).

- L. tauricum* Willd. — Azn. BSBF 46: 153 (BSBF 44: 167 als *L. flarum* L.). — A.

- L. tenuifolium* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E.

- L. usitatissimum* L. var. *humile* (Mill.) Pers. — Azn. BSBF 44: 167 (als Art). — E, A.

Oxalidaceae.

- Oxalis corniculata* L. — Azn. MBL 12: 161. — Beg. 221. — H. M. 159. — E: Konstantinopel; Aiwan Serai; Orta-Köj; Böyük-Dere, Wiese; Konstantinopel (W 122). — A: Adampol (Azn.); Alemdagh (Azn.); Anadolu-Kavagi (Azn.); Prinkipo (Beg., H. M.); Beikos.

Geraniaceae.

- Geranium asphodeloides* Burm. — Bornm. 32. — Krause 2: 24. — E: Therapia; Wald von Belgrad (Bornm., Nemetz); Böyük-Dere; San Stefano. — A: Beikos; Feuerberg bei Tschengel-Köj; Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan; Ufer des Bosporus (Krause). — Die von Nemetz gesammelten Exemplare entsprechen der ssp. *tauricum* (Rupr.) Fritsch.
- G. columbinum* L. — Azn. BSBF 46: 141. — A: Zwischen Alemdagh und Husseinli (Azn.).
- G. dissectum* L. — E: Domusdere; San Stefano; Konstantinopel (W 235). — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.
- G. lanuginosum* Lam. — Azn. BSBF 46: 141. — A: Zwischen Alemdagh und Husseinli (Azn.).
- G. lucidum* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.); Zekerie-Köj; zwischen Schischli und Kiat-Hane. — A: (Azn.).
- G. molle* L. — E: Konstantinopel (W 234).
- G. purpureum* Vill. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.); Konstantinopel (W 237).
- G. rotundifolium* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E: Jedi-Kule; Konstantinopel (W 236.) — A: (Azn.); Brussa, Spitalberg.
- G. sanguineum* L. — Krause 2: 24. — A: Zwischen dem Ufer des Bosporus und dem Alem-Dagh (Krause).
- G. tuberosum* L. — Azn. BSBF 44: 168. E: (Azn.); San Stefano. — A: (Azn.); Pendik.
- G. villosum* Ten. — Azn. BSBF 44: 168; BSBF 46: 141 (als *G. molle* L. var. *macropetalum* Boiss.). — E: (Azn.); Orta-Köj; Kütschük-Tschekmadsche; Schischli (Azn., Nemetz); Dschendere; Bagtsche-Köj; Konstantinopel (W 238). — A: Brussa, am Fuß des Bithyn. Olymp; Tschengel-Köj (Azn.).
- Erodium ciconium* (Jusl.) Willd. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Kartal; Tusla.
- E. cicutarium* (L.) L'Her. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.); Dschendere. — A: Dschamlidscha.
- E. gruinum* (L.) L'Her. — A: Kartal, Pendik.
- E. malacoides* (L.) Willd. — E: San Stefano.
- E. malacoides* (L.) Willd. var. *malvaceum* (Jord.) Graebn. — A: Kartal Bahndamm.

Zygophyllaceae.

- Peganum harmala* L. — Azn. BSBF 46: 141. — E: Jedikule (Azn.).
- Tribulus terrestris* L. var. *typicus* Beck — Azn. MBL 1: 303. — Beg. 221 (ohne nähere Bestimmung). — E: Flamur; Böyük-Dere; Kilia (Sämtlich Azn.). — A: Prinkipo (Beg.).
- Tribulus terrestris* L. var. *mucronatus* Rouy & Fouc. — Azn. MBL 1: 303. — A: Tusla (Azn.).
- Tribulus terrestris* L. var. *orientalis* (Kerner) Beck. — Azn. MBL 1: 303. — A: Anadoli-Hissar; zwischen Bostandschik und Kartal (Azn.).

Rutaceae.

Ruta montana L. — Krause 2: 25. — E: Schischli; Orta-Köj, sonnige Hügel. — A: Alemdagh (Krause).
Haplophyllum Buxbaumii Boiss. — E: Konstantinopel (W 208).

Polygalaceae.

Polygala comosa Schk. — Azn. BSBF 44: 166. — E.
P. monspeliacae L. — Azn. BSBF 44: 166. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Armeni-Köj bei Skutari.
P. supina Schreb. — Bornm. 34. — E: Wald von Belgrad (Bornm.); Dschendere. — A: Josua-Dagh bei Beikos; Bithynischer Olymp, 1000 m.

Anacardiaceae.

Pistacia lentiscus L. — Beg. 221. — A: Prinkipo (Beg.).
P. mutica Fisch & Mey. — H. M. 162. — A: Prinkipo (H. M.).
P. Terebinthus L. — Beg. 221. — E: Domusdere, Düne. — A: Prinkipo (Nemetz, Beg.).
Rhus Coriaria L. — E: San Stefano, Strand.

Aceraceae.

Acer campestre L. var. *eriocarpum* Wallr. f. *mollissimum* Tausch. — E: Zekerie-Köj. — A: Armeni-Köj.
A. campestre L. — E: Dschendere, Wald von Belgrad. — A: Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan.
A. tataricum L. — Krause 2: 233. — A: Alem-Dagh (Krause).

Celastraceae.

Evonymus europaeus L. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.

Rhamnaceae.

Paliurus Spina Christi Mill. — Degen 45: 68. — E: San Stefano, Bahndamm; Ufer des Bosporus (Degen). Konstantinopel (W 109). — A: Jum Burnu, Hügel gegen Riva.

Vitaceae.

Vitis vinifera L. — Azn. BSBF 44: 168. E.
Vitis silvestris Gmel. — A: Beikos, Wald.

Crassulaceae.

Sedum album L. — Azn. BSBF 44: 170. — E.
S. altissimum Poir. — Azn. MBL 12: 165. — H. M. 163. — Beg. 221 (als *S. nicaeense* All.) — E: Stambul (Azn., W 231). — A: Halki (Azn.); Prinkipo (Azn., Nemetz, Beg. H. M.).

- S. ampexicaule* DC. — Azn. BSBF 44: 170. — E: (Azn.); Schischli, sonnige Hügel.
- S. glaucum* W. K. — Azn. BSBF 44: 170 (var. *pallidum* [M. B.] Hay. als Art); MBL 12: 165 (var. *bithynicum* Boiss.). — E: Pera (Azn. var. *bithynicum*); Schischli, sonnige Hügel; Orta-Köj. — A: Dschamlidscha (Nemetz, W 232) Gök-Su.
- S. proponticum* Azn. — Azn. BSBF 44: 169. — A: Kartal.
- Tillaea muscosa* L. — Azn. BSBF 44: 169. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Tusla.
- Cotyledon pendulinus* (DC.) Batt. — E: Therapia, Felsen. — A: Aidos-Dagh bei Kartal.
- C. Umbilicus Veneris* L. — Beg. 221. — A: Prinkipo (Beg.).

Saxifragaceae.

- Saxifraga rotundifolia* L. — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei 1000 m.
- S. tridactylites* L. — Azn. BSBF 44: 170 und MBL 2: 143. — E: Konstantinopel; Kumbaschi (Azn. var. *exilis* Engl.); Zwischen Pera und Jidi-Kule (Azn. f. typ.).

Rosaceae.

- Filipendula hexapetala* Gilib. — Azn. BSBF 44: 169 (als *Spiraea filipendula* L.) — E: (Azn.). — A: (Azn.); Dschamlidscha.
- Rubus caesius* × *tomentosus* var. *canescens*? — A: Beikos, Wald.
- R. tomentosus* Borkh. var. *canescens* Wirtg. — E: Schischli; Orta-Köj.
- R. tomentosus* × *ulmifolius*, — E: Orta-Köj; Kütschük-Tscheke-medische, Wassergabben. — A: Prinkipo, Feldraine.
- R. tomentosus* × *ulmifolius* ssp. *anatolicus*. — H. M. 164 (als *R. sanctus* Schreb.) — A: Prinkipo (H. M.).
- R. ulmifolius* Schott. — E: Rumeli-Fanar.
- R. ulmifolius* Schott ssp. *anatolicus* Focke. — Beg. 221 (als *R. amoenum* Port.). — A: Prinkipo (Beg.).
- R. ulmifolius* Schott ssp. *dalmatinus* (Tratt.) Focke. — E: Orta-Köj.
- R. ulmifolius* Schott ssp. *rusticanus* (Merc.) Focke. — Umgebung von Konstantinopel, ohne näheren Fundort.
- Fragaria vesca* L. — E: Wald von Belgrad; Bagtsche-Köj. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.
- Potentilla canescens* Bess. — Azn. BSBF 44: 169 (als *P. inclinata* Vill. var. *canescens* Bess.). — A.
- P. canescens* Bess. var. *virescens* (Boiss.) Th. Wolf. — Azn. BSBF 44: 169 (als *P. inclinata* Vill. var. *virescens* Boiss.). — E.
- P. hirta* L. — Azn. BSBF 44: 169. — E: (Azn.); Schischli, trockene Hügel gegen Kiat-Hane.
- P. reptans* L. — E: Böyük-Dere, Sommerpalast.
- P. taurica* Willd. — Bornm. 34. — E: Kiat-Hane, Hügel beim Pumpwerk; Wald von Belgrad (Bornm.).
- Alchemilla minutiflora* Azn. — Azn. BSBF 46: 141, MBL 2: 142. — E: Silihdar; Kiathane-Köj. — A: Zwischen Bostandschik und Baschiböyük. (Sämtlich Azn.).

- Geum urbanum* L. — E: Wald von Belgrad, bei den Bends; Konstantinopel (W. 229). — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Beikos, Wald; Bithynischer Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- Agrimonia Eupatoria* L. — E: Zekerie-Köj; San Stefano, ausgetrockneter Sumpf; Kütschük-Tschechkmedsche, Wassergraben; Rumeli-Fanar, Bachufer. — A: Böyük-Gök-Su.
- Sanguisorba minor* Scop. — E: Zekerie-Köj; Belgrader Wald; Domus-Dere, im Busch. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Aidos-Dagh.
- S. muricata* (Spach) Focke. — Azn. BSBF 44: 169 (als *Potorium m.* Spach). — E, A.
- S. villosa* (S. S.) Dörfsl. — Azn. MBL 12: 165. — Degen 41: 232. (Beide als *Poterium v.* Sibt. Sm.). — E: Zwischen Konstantinopel und Maslak (Degen); Konstantinopel (W. 250). — A: Bulgurlu bei Skutari (Degen); zwischen Adampol und Anadolu-Hissar (Azn.).
- Poterium spinosum* L. — Degen 45: 68. — H. M. 166. — Beg. 221. — E: Schischli; Dschendere; Pyrgos; Orta-Köj. — A: Kaisch-Dagh; Riva (Degen); Prinkipo (Beg.; H. M.).
- Rosa agrestis* Savi. — Azn. BSBF 44: 169. — E.
- R. canina* L. ssp. *lutetiana* (Lem.) Hayek ex Hayek, Prodr. Fl. Balc. ? Messarburnu.
- R. dumetorum* (Thuill.) Hay. ssp. *urbica* (Lem.) Hay. — Azn. BSBF 44: 169 (als Art). — A.
- R. gallica* L. — E: Dschendere, trockene Hügel.
- R. Juulzillii* Bess. — Azn. BSBF 44: 169 als *R. trachyphylla* Rau. — E.
- R. sempervirens* L. var. *scandens* (Mill.) DC. — Azn. MBL 2: 142. — E: Kumbaschi (Azn.).
- R. sempervirens* L. var. *microphylla* DC. — Azn. MBL 2: 142. — A: Sultanie (Azn.).
- R. turcica* Rouy (e descr.). — Azn. BSBF 44: 169. — E: (Azn.). — A: Dschamlidscha.
- Cydonia oblonga* Mill. — E: Konstantinopel (W. 228). — A: Feuerberg bei Tschengel-Köj, verwildert.
- Sorbus torminalis* (L.) Cr. — E: Dschendere, Wald von Belgrad.
- Pirus amygdaliformis* Vill. — Azn. MBL 12: 164. — A: Zwischen Kartal und Dschesida (Grisebach nach Azn.); Soghanli (Azn.).
- P. eleagrifolia* Pall. — Azn. MBL 12: 164. — A: Alemdagh (Azn.).
- Malus pumila* Mill. — E: Wald zwischen Bagtsche-Köj und Böyük-Dere.
- M. silvestris* (L.) S. F. Gray. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m, Busch.
- Pyracantha coccinea* Röm. — E: Belgrader Wald bei Dschendere. — ? Messarburnu
- Crataegus monogyna* Jacq. — Azn. BSBF 44: 169. — E: (Azn.); Böyük-Dere. — A: (Azn.); Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan; Kartal, baumlose Ebene.
- C. monogyna* Jacq. var. *kyrtostyla* (Fingerh.) Beck — Azn. MBL 2: 142. — E: Tschinar-Tscheschmessi. — A: Alemdagh. (Beide Azn.).
- C. monogyna* Jacq. var. *pachycarpa* Azn. — Azn. MBL 2: 142. — E: Tschinar-Tscheschmessi. — A: Zwischen Beikos und Jeni-Tschiftlik. (Beide Azn.).

C. monogyna Jacq. var. *splendens* C. Koch. — A: Josua-Dagh bei Beikos.

Mespilus germanica L. A: Beikos, Wald; Bithynischer Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.

Prunus avium L. — Azn. BSBF 44: 169 (als *Cerasus a.* Mnch.) — A. *P. divaricata* Ledeb. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.

P. Mahaleb L. A: Kütschük-Gök-Su, Strauch.

Papilionaceae.

Cersis Siliquastrum L. — E: Rumeli-Hissar. — A: Brussa, Weg zu den Bädern.

Sophora reticulata Freyn & Sint. var. *Buxbaumii* (Azn.) Hay. — Azn. MBL 12: 163 (als *Goebelia r.* Freyn & Sint. var. *B.* Azn.). — E: Zekerie-Köj. (Nemetz); Skumruköj; Jerliköj; Uzum-Dere. — A: Zwischen Bozhane und Orumdsche. (Sämtlich Azn.).

Colutea arborescens L. — BSBF 44: 168. — E, A.

Astragalus glycyphylloides L. — BSBF 44: 168. — E.

A. hamosus L. — E: Konstantinopel (W. 90). — A: Tusla, Felddraine; Brussa, sonniges Flußufer.

A. sinicus Boiss. — Azn. BSBF 44: 168. — A.

Galega officinalis L. — E: Rumeli-Fanar. — A: Haidar-Pascha (W 132).

G. pectinata Stev. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.

Psoralea bituminosa L. — Azn. MBL 12: 162. — E: Jedi-Kule; Böyük-Dere (Azn.); Therapia (Azn.); San Stefano (Azn.). — A: Kartal (Azn., W. 130); Kandilli, altes Schloß; Antigoni (W 130).

Cicer Montbretii Jaub. & Spach — Azn. MBL 2: 141. — Degen 41: 232. — A: Zwischen Candilli und Anatoli-Hissar, an den „Süßen Wassern“. (Degen).

Vicia amphicarpa Dorth. — Azn. MBL 2: 141. — E: Zwischen San Stefano und Floria (Azn.).

V. bithynica L. — E: Zwischen Kilia und Zekerie-Köj, Felddraine.

V. cassubica L. — Azn. BSBF 44: 168 (var. *villosa* Azn.). — E: Rumeli-Fanar, Raine. — A: (Azn.).

V. cracca L. ad ssp. *incana* (Vill.) Rouy accedens. — Azn. BSBF 44: 168 (typ.). — E: (Azn.); Bagtsche-Köj, Wald; Böyük-Dere; Konstantinopel (W 137). — A: (Azn.); Beikos, Josua-Dagh; Dscham-lidscha.

V. dasycarpa Ten. — Azn. BSBF 44: 169 (als *V. varia* Host) — E.

V. hirsuta (L) S. F. Gray. — A: Josua-Dagh bei Beikos; Antigoni (W 87).

V. hybrida L. — E: San Stefano; Balukli im Getreide; Makriköj (W 135).

V. lathyroides L. — E: Dschendere. — ? Bosporus (W 133).

V. lutea L. — Azn. BSBF 44: 168.

V. narbonensis L. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Tusla (forma *stipulis dentatis*. Annäherung an ssp. *serratifolia* [Jacq.] Vel. ?).

V. onobrychoides L. Azn. BSBF 44: 168. — E.

V. pannonica Jacq. ssp. *striata* (M. B.) Hay. — Azn. BSBF 44: 168 (als var. *purpurascens* Boiss.) — E.

- V. punbescens* (DC) Lk. — ? Bosporus (W. 91).
- V. sativa* L. ssp. *cordata* (Wulf.) Asch. & Gr. — A: Josua-Dagh bei Beikos.
- V. sativa* L. var. *incisa* (M. B.) Boiss. — Azn. BSBF 44: 168 (als Art). — E.
- V. Sibthorpii* Boiss. — Azn. MBL 2: 142. — A: Kurdköj (Azn.).
- V. tenuifolia* Roth var. *elegans* (Guss.) Arcang. — Azn. BSBF 44: 169 (als Art). — E.
- V. villosa* Roth. — Azn. BSBF 44: 169. — E: (Azn.). — A: Antigoni (W 120).
- Lathyrus Aphaca* L. — Azn. BSBF 44: 169 (f. *subbiflora* Azn.) und MBL 12: 162 (var. typ., var. *biflorus* Post, var. *affinis* [Guss.] Ces. Pass. Gib.) — E: (Azn.); Konstantinopel (W. 134). — A: (Azn.).
- L. Aphaca* L. var. *grandiflora* Heldr. — E: San Stefano. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.
- L. aureus* (Stev.) Brandza. — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.
- L. cicera*¹⁾ L. — E: San Stefano.
- L. Clymenum* L. E: Zekerie-Köj, Felddraine.
- L. Clymenum* L. var. *articulatus* (L) Arc. — Azn. MBL 2: 142 (als *L. articulatus* L. var. *latifolius* Rouy). — A: Maltepe (Azn.).
- L. digitatus* (M. B.) Fiori. — Bornm. 31 (als *Orobus sessilifolius* Sibth.). — E: Kilia, Hügel; Therapia; Wald von Belgrad (Bornm.); — Schischli; Wald bei Bagdsche-Köj; Dschendere; Süße Wasser Europas (W 136). — A: Dschamlidscha.
- L. Gorgonii* Parl. — Azn. BSBF 44: 169 (als *L. amoenus* Fenzl). — E.
- L. inconspicuus* L. var. *stans* Vis. — Azn. BSBF 44: 169 (als *L. erectus* Lag.). — E: (Azn.). — A: Antigoni (Azn., W. 88).
- L. inermis* Roch. — Bornm. 31 (als *Orobus hirsutus* L.). — E: Wald von Belgrad. (Bornm.).
- L. inermis* Roch. var. *glabratus* Gris. — E: Böyük-Dere; Wald von Belgrad. — A: Bithynischer Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- L. niger* (L) Bernh. — E: Wald bei Bagdsche-Köj.
- L. sativus* L. — E: Felddraine zwischen Zekerie-Köj und Kilia; Domusdere.
- L. sphaericus* Retz. — A: Josua-Dagh bei Beikos.
- L. undulatus* Boiss. — E: Dschendere; Bagdsche-Köj, Therapia. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Wald bei Beikos; Bithynischer Olymp, Gebüsch bei 1000 m.
- Pisum elatinus* Stev. ap. M. B. — E: Zekerie-Köj, Felddraine; — A: Tusla.
- Ononis Columnae*²⁾ All. — Azn. MBL 2: 137 (als *O. pusilla* L.). — E: Halkali.
- O. mitissima* L. — Azn. BSBF 44: 168. E, A.

¹⁾ Die meisten von Nemetz gesammelten Exemplare wurden von Dr. G. Širjaev, Brünn, revidiert.

²⁾ Vergl. G. Širjaev: Generis *Ononis* L. revisio critica. Beih. Bot. Centralbl. 49 (1932) Abt. 2, p. 381–665.

- O. reclinata* L. var. *mollis* (Savi) Heldr. — Azn. BSBF 44: 168 (als var. *minor* Mor.) — E, A.
- O. spinosa* L. — ? Bosporus (W 138).
- O. spinosa* L ssp. *antiquorum* (L) Briq. var. *glandulifera* Hal. — Azn. MBL 2: 138 (als *O. decipiens* Azn.). — E: San Stefano (Azn.); Schischli (Azn.); R. Feneri (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche, Wassergraben. — A: Maltepe (Azn.).
- O. riscosa* L. ssp. *breriflora* (DC) Rouy — Azn. BSBF 44: 168 (als Art.). — E, A.
- Trigonella Balansae*¹⁾ Boiss. & Reut. — Azn. BSBF 46: 141. — A: Tusla (Azn.).
- T. Foenum graecum* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. gladiata* Stev. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Kartal, Bahndamm.
- T. monspeliaca* L. — Azn. MBL 12: 161. — E: Kürütscheschme; Ejub; San Stefano; Flora. — A: Kartal; Jakarschik; Pendik; Tusla (Sämtlich Azn.); Antigoni (W 129).
- T. procumbens* (Bess.) Rchb. — Azn. BSBF 44: 168 (als *T. Besseriana* Ser.) — E.
- Medicago arabica* (L.) All. — E: Konstantinopel (W 86).
- M. Blancheana* Boiss. — Azn. BSBF 44: 168 und BSBF 46: 141 (typ. und var. *inermis* Urb.). — E: Makri-Köj (Azn.).
- M. ciliaris* (L.) Willd. — Azn. BSBF 44: 168. — E.
- M. disciformis* DC. — A: Pendik.
- M. falcata* L. — E: Kütschük-Tschekmedsche, Wassergraben; Konstantinopel (W 145).
- M. falcata* × *sativa* (= *M. varia* Martyn.). — E: Balukli, Felddraine.
- M. globosa* Presl. — Azn. BSBF 44: 168. — A.
- M. hispida* Gärtn. f. *apiculata* (Willd.) Urb. — Azn. BSBF 44: 168 (als Art.). — E.
- M. hispida* Gärtn. var. *denticulata* (Willd.) Urb. Azn. MBL 2: 140 (als Art.) — E: Schüschli; Kürütscheschme; Konstantinopel (W 114). A: Kartal; Antigoni (Sämtlich Azn.).
- M. hispida* Gärtn. var. *lappacea* (Desr.) Hal. — A: Tusla; Pendik; Beikos, Wald; Brussa, sonniges Flußufer.
- M. litoralis* Rhode. — Azn. BSBF 44: 168. — E: Konstantinopel (W 144). — A: (Azn.).
- M. litoralis* Rhode var. *longiseta* DC. — E: Kütschük-Tschekmedsche, Düne.
- M. lupulina* L. var. *glandulosa* Koch. — Azn. MBL 2: 140. — A: Zwischen Kartal und Maltepe (Azn.).
- M. marina* L. — Degen 45: 68. — E: Kütschük-Tschekmedsche, (Nemetz, W 143), Düne; Kilia, Düne. — A: Riva (Degen).
- M. minima* (L.) Desr. var. *longiseta* Ser. — A: Brussa, Spitalberg; Beikos, Wald.
- M. murex* Willd. var. *aculeata* Urb. f. *sphaerocarpa* (Bert.) Urb. — E: Konstantinopel (W 146).

¹⁾ Vgl. Širjaev: Generis *Trigonella* L. revisio critica. — Public. Fac. Sc. Univers. Masaryk, Brno 1928—1934.

- M. orbicularis* (L.) All. — E: Jedi-Kule; Konstantinopel (W 112). — A: Pendik; Brussa, sonniges Flußufer und Weg zu den Bädern.
- M. praecox* DC. — Azn. BSBF 46: 141. — A: Erenköj (Azn.).
- M. rigidula* (L.) Desr. — Azn. BSBF 44: 168 (als *M. Gerardi* Kit.) — E.
- M. rigidula* (L.) Desr. var. *agrestis* (Ten.) Burn. — Azn. BSBF 44: 168 (als Art). — E: (Azn.). — A: (Azn.); Brussa, sonniges Flußufer.
- M. sativa* L. — Azn. BSBF 44: 168. — A: (Azn.); Böyük-Gök-Su. Barrage der Wasserleitung.
- M. scutellata* All. — Azn. BSBF 44: 168. — E.
- M. tribuloides* Desr. — E: Konstantinopel (W 81).
- Melilotus indicus* (L) All. — Azn. BSBF 44: 168 (als *M. parviflora* Desf.). — E: (Azn.). A: (Azn.); Antigoni (W 115).
- M. officinalis* (L.) Desr. — Azn. BSBF 44: 168. — E: San Stefano (Azn., Nemetz); Pancaldi (Azn.); Floria (Azn.); Schischli. — A: Maltepe (W 82).
- M. segetalis* (Brot.) Ser. — Azn. BSBF 44: 168 (als *M. infestu* Guss. ex Boiss.). — E.
- M. sicutus* (Turr.) Jacks. — Azn. BSBF 44: 168 (als *M. messanensis* All.). — E.
- M. sulcatus* Desf. — Azn. MBL 12: 161. — E: Zwischen Makri-köj und San Stefano. — A: Riva. (Sämtlich Azn.).
- Trifolium angustifolium*¹⁾ L. — Azn. MBL 12: 161. — E: Zekerie-Köj; Böyük-Dere; Schischli; Makri-Köj; San Stefano. — A: Halki; Dschamlidscha (Nemetz, W 147). — (Sonst Azn.).
- T. arvense* L. — E: Schischli. — A: Dschamlidscha.
- T. campestre* Schreb. — A: Beikos; Brussa, sonniges Flußufer und Weg zu den Bädern; Antigoni (W. 96).
- T. Cherleri* Jusl. — E: Zekerie-Köj; Domus-Dere. — A: Brussa, sonniges Flußufer; Dschamlidscha.
- T. constantinopolitanum* Ser. — Bornm. 31 (als *T. Alexandrinum* L.). — E: Domus-Dere, Rain; Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Antigoni (W 92).
- T. dulmaticum* Vis. — Azn. BSBF 44: 168. — A.
- T. echinatum* Savi. — Azn. BSBF 44: 168 (als *T. supinum* Savi). — E.
- T. fragiferum* L. Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. globosum* L. — Bornm. 31. — E: Zekerie-Köj; Schischli, sonnige Hügel gegen Kiat-Hane; Domus-Dere; Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Beikos; Josua-Dagh bei Beikos; K. Dschamlidscha (W 94). — ? Messarburnu.
- T. glomeratum* L. — Antigoni (W. 84).
- T. hirtum* All. — Azn. BSBF 44: 168. E: (Azn.). — A: (Azn.); Brussa, sonniges Flußufer.
- T. hybridum* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E.
- T. hybridum* ssp. *elegans* (Savi) A. & Gr. — Azn. BSBF 44: 168 (als Art). — E.
- T. incarnatum* L. var. *elatius* Gib. & Belli. — E: Böyük-Dere.
- T. lagopus* Pourr. — Azn. BSBF 44: 168. — E.

¹⁾ Vgl. F. Hermann: Übersicht über die europäischen Rotten und Arten der Gattung *Trifolium*. Repert. Spez. Novar. 39, 1936: 332–351.

- T. lappaceum* L. — Azn. BSBF 44: 168. E, A.
- T. leucanthum* M. B. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. maritimum* Huds. — Azn. BSBF 44: 168. E, A.
- T. medium* L. — Azn. BSBF 44: 168. — A.
- T. Meneghinianum* Clem. — Azn. MBL 2: 140. —
- T. Michelianum* DC. — Azn. BSBF 44: 168; MBL 12: 161 (var. *Balansae* (Boiss.) Azn. mit f. *lydum* Azn. und f. *transiens* Azn.) E; Schischli (f. *transiens*). — A: Prinkipo (f. *transiens*): Riva (typ.). (Sämtlich Azn.).
- T. nigrescens* Viv. — Bornm. 31. — E: Dschendere; Wald von Belgrad (Bornm.).
- T. ochroleucum* Huds. — A: Dschamlidscha.
- T. pallidum* W. K. — Azn. BSBF 44: 168. — E.
- T. pannonicum* Sm. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. parviflorum* Ehrh. — A: Antigoni (W. 51).
- T. Petrisarii* Clem. — Bornm. 31. — E: Wald von Belgrad (Bornm.).
- T. pratense* L. — E: San Stefano (Nemetz, W 148). — ? Messarburnu.
- T. Presliatum* Boiss. — A: Dschamlidscha.
- T. radiosum* Wahlenbg. — Bornm. 32 (als *T. nidificum* Gris.). — E: Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Kartal.
- T. repens* L. — E: Kilia, Bachusfer; Konstantinopel (W 150).
- T. resupinatum* L. — Bornm. 31. — E: Schischli; Kilia, Bachusfer; Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Pendik; Antigoni (W 98).
- T. scabrum* L. — E: Kütschük-Tschekekmedsche, Düne. — A: Antigoni (W 85).
- T. scabrum* L. var. *maius* Gib. & Belli. Azn. BSBF 44: 168 (als *T. turcicum* Vel.); MBL 2: 140 (als *T. lucanicum* Gasp.). — A: Dschamlidscha; Gös-Tepe; Drakos; Pendik. (Sämtlich Azn.).
- T. Sebastiani* Savi. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. spinosum* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. stellatum* L. — H. M. 170. — E: San Stefano; Dschendere. — A: Beikos, Wald; Feuerberg; Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 148), K.-Dschamlidscha (W 148). — ? Messarburnu.
- T. striatum* L. — Bornm. 32. — Azn. BSBF 46: 141 (var. *macrodontum* Boiss.). — E: Jeni-Mahalle (Azn.); Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Alemdagh (Azn.); Halki (Azn.).
- T. subterraneum* L. — Bornm. 32. — Azn. BSBF 44: 168 (var. *glabrescens* Azn.). — E: (Azn.); Wald von Belgrad (Bornm.); Dschendere. — A: (Azn.).
- T. suffocatum* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A.
- T. tomentosum* L. — E: Kütschük-Tschekekmedsche (W 93). — A: Pendik; Kartal; Brussa, sonniges Flusser; Antigoni (W 93).
- T. uniflorum* L. var. *Buxbaumii* (Sternbg.) Vierh. — Bornm. 32 (ohne Angabe der Var.) — E: Schischli; San Stefano, Wiese; Wald von Belgrad (Bornm.) — A: Dschamlidscha.
- T. uniflorum* L. var. *varians* Vierh. — „In agro Byzantino“ (Noë).
- T. vesiculosum* Savi. — Azn. BSBF 44: 168 (als *T. multistriatum* Koch). — E.

- Dorycnium graecum* (L.) Ser. — Degen 41: 232. — E: Therapia, Sommer-Palast; Domus-Dere; Ufer des Bosporus (Degen). — A: Antigoni (W 95).
- D. hirsutum* L. — H. M. 170. — A: Prinkipo (H. M.).
- Lotus angustissimus* L. — E: Orta-Köj.
- L. corniculatus* L. ssp. *tenuis* (Kit.) Briq. — Azn. BSBF 44: 168 (als *L. tenuifolius* Rchb.). — E: (Azn.); Balukli, Felddraine; Konstantinopel (W 152).
- L. edulis* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E, A. — ? Pitta (W 89).
- L. ornithopodioides* L. — E: San Stefano. — A: Kütschük-Gök-Su.
- L. peregrinus* L. — Azn. BSBF 44: 168. — A: (Azn.); Tusla.
- Securigera Securidacea* (L.) Deg. & Dörf. — E: San Stefano. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Kartal, Wegränder und Felddraine.
- Hymenocarpus circinnatus* (L.) Savi. — E: Konstantinopel (W 97). — A: Beikos; Kütschük-Gök-Su.
- Physanthurus tetraphylla* (L.) Boiss. — Azn. BSBF 44: 168. — E.
- Lupinus angustifolius* L. — E; Zekerie-Köj am Belgrader Wald; Dschendere.
- L. graecus* Boiss. — Azn. BSBF 44: 168. — A.
- L. hirsutus* L. var. *micranthus* (Guss.) Boiss. — Azn. BSBF 44: 168. — Degen 45: 68. (Beide als Art). — E: Ufer des Bosporus (Degen). — A: (Azn.).
- L. pilosus* L. — Azn. BSBF 46: 141. — E: Bagtsche-Köj. (Azn.).
- L. Termis* Forsk. Azn. BSBF 44: 168 (typ.); MBL 1: 304 (var. *variegatus* Azn. — nur A.). — E. — A: Pascha-Bagtsche; Kanlidscha (Sämtlich Azn.).
- Ulex europaeus* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E: Rumeli-Hissar, Hecke. — A: (Azn.); Josua-Dagh bei Beikos, nicht kultiviert!
- Cytisus hirsutus* L. ssp. *ciliatus* (Wahlenbg.) Asch. & Gr. var. *Grisebachii* Briq. — E: San Stefano. — A: Aidos-Dagh, Gestrüpp.
- C. hirsutus* L. var. *hirsutissimus* (C. Koch) Boiss. — A: Rumeli-Karak (W. 139). — A: Bithynischer Olymp, sonniger Hang bei 1000 m und Wald bei Ak-Dschellan.
- C. monspessulanus* L. — A: Alem-Dagh.
- C. pygmaeus* Willd. — Bornm. 34. — Degen 41: 232. — E: Zekerie-Köj; Schischli, trockenes, sonniges Terrain; Domus-Dere; Ufer des Bosporus (Degen); Wald von Belgrad (Bornm.). — A: Aidos-Dagh bei Kartal; Josua-Dagh bei Beikos.
- C. supinus* L. Azn. BSBF 46: 141 (als *C. capitatus* Jacq.). — E: Safra-Köj; Halkali (Beide Azn.).
- Calycotome villosa* (Poir.) Lk. — H. M. 170. — E: Dschendere; Zwischen Dschendere und Kiat-Hane. — A: Beikos, sonniger Hang; Prinkipo (H. M.).
- Genista carminalis* Griseb. — Degen 41: 232. — E: Ufer des Bosporus (Degen) — A: Armeni-Köj.
- G. lydia* Boiss. — Degen 41: 232. — E: Ufer des Bosporus (Degen). — A: Aidos-Dagh.
- G. tinctoria* L. — E: Zekerie-Köj, Wald. — A: Aidos-Dagh.
- Spartium junceum* L. — E: Therapia. — A: Antigoni (W 142).

- Ornithopus compressus* L. Azn. BSBF 44: 168. — Bornm. 32. — E: (Azn.); Dschendere; Wald von Belgrad (Bornm.). — A: (Azn.); Josua-Dagh bei Beikos; Antigoni (W 117).
- O. sativus* Brot. — Azn. BSBF 44: 168. — A. — Das spontane Vorkommen dieser westmediterranen Art im Gebiet ist unwahrscheinlich.
- Coronilla¹⁾ cretica* L. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Antigoni (W 83). — ? Bosporus (W 83).
- C. scorpioides* (L.) Koch. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.); Balukli, im Getreide. — A: (Azn.); Pendik; Antigoni (W 118).
- C. varia* L. — A: Böyük-Gök-Su, Barrage der Wasserleitung.
- Hippocrepis unisiliquosa* L. — E: San Stefano, Bahndamm; Konstantinopel (W 80). — A: Pendik.
- Scorpiurus subrillosus* L. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Antigoni (W. 116).
- Onobrychis²⁾ aequidentata* Urv. — A: Pendik.
- O. caput galli* (L.) Lam. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Feuer-Bagtsche (W 140).
- D. gracilis* Bess. — Azn. BSBF 44: 168. — E: (Azn.); Kütschük-Tschenkmedsche (f. *typica* Šir.). — A: (Azn.).

Thymelaeaceae.

- Lygia pubescens* Boiss. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
- Daphne pontica* L. — Bornm. 33; Krause 2: 28. — E: Wald von Belgrad (Bornm., Krause); Theraphia (Nemetz, Dingler nach Krause); Bagtsche-Köj; Böyük-Dere (Dingler nach Krause); Rumeli-Karak (W 113). — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.
- D. pontica* L. var. *Szovitsii* (C. Koch) Mssn. det. Keissler. — A: Wald bei Beikos.
- D. sericea* Vahl. — A: (W 111).

Lythraceae.

- Lythrum flexuosum* Lag. — A; BSBF 44: 169 (als *L. Graefferi* Ten.). — E.
- L. Hyssopifolia* L. — E: Rumeli-Fanar.
- L. Salicaria* L. — E: Dschendere, Kiat-Hane-Su; San Stefano; Rumeli-Fanar.
- L. Salicaria* L. var. *tomentosum* (Mill.) DC. — Azn. MBL 12: 165. — E: Rumeli-Fanar, Bachufer.
- L. trilobatum* Salzm. — Azn. BSBF 44: 169 (als *L. vibracteatum* Salzm.). — A.
- Peplis borysthrenica* M. B. — Azn. . . . , — A: Yakadschik (Azn.).
- P. erecta* Req. — E: Dschamlidscha.
- P. portula* L. — Azn. BSBF 46: 142. — A: Alemdagh (Azn.).

¹⁾ Vergl. A. Uhrova: Revision der Gattung *Coronilla* L. — Beihefte z. Bot. Centralbl. Bd. 53 (1939), Abt. B, p. 1–174.

²⁾ Die von Nemetz gesammelten Exemplare wurden von G. Širjaev, Brünn, bestimmt.

Lythraceae.

- Lythrum flexuosum* Lag. — Azn. BSBF 44: 169 (als *L. Graefferi* Ten.). — E.
L. Hyssopifolia L. — A; Rumeli-Fanar.
L. Salicaria L. — E: Dschendere, Kiat-Hane-Su; San Stefano; Rumeli-Fanar.
L. Salicaria L. var. *tomentosum* (Mill.) DC. — Azn. MBL 44: 165. — E: Rumeli-Fanar, Bachufer.
L. tribalteatum Salzm. — Azn. BSBF 44: 169 (als *L. bibracteatum* Salzm.). — A.
Peplis borysthenica M. B. — A; Yakadschik (Azn.).
P. erecta Req. — E: Dschamlidscha.
P. portula L. — Azn. BSBF 46: 142. — A: Alemdagh (Azn.).

Oenotheraceae.

- Ludwigia palustris* (L.) Elliot. — Azn. BSBF 44: 169. — E.
Epilobium hirsutum L. var. *tomentosum* (Vent.) Boiss. — E: San Stefano, Bahndamm; Rumeli-Fanar, Bachufer.
E. parviflorum (Schreb.) With. var. *brevifolium* Hsskn. — E: Kiat-Hane.

Holarrhagidaceae.

- Myriophyllum spicatum* L. — Azn. BSBF 44: 169. — E, A. — E: Rumeli-Fanar-Dere.
M. verticillatum L. — Azn. BSBF 46: 142 (var. *pinnatifidum* Wallr. und var. *intermedium* Koch). — E: Dschendere, Kiat-Hane-Suju (Nemetz, Azn.).

Callitrichaceae.

- Callitricha pedunculata* DC. — Azn. MBL 2: 143, MBL 12: 165. — E: Bagdsche-Köj. (Azn.).
C. stagnalis Scop. — Azn. MBL 2: 143. — E: Bagtsche-Köj (Azn.); Kilia, Bachufer.

Cornaceae.

- Cornus mas* L. — A: Wald bei Beikos; Feuerberg bei Tschengel-Köj.
C. sanguinea L. — A: Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan; Brussa, Weg zu den Bädern.

Araliaceae.

- Hedera Helix* L. — Beg. 222. — E: Konstantinopel, Stadtmauern. — A: Prinkipo (Beg.).

Umbelliferae.

- Sanicula europaea* L. — Azn. BSBF 44: 170. — E: (Azn.); Wald von Belgrad; Konstantinopel (W 241). — A: (Azn.); Beikos, geg. Josua-Dagh.
Eryngium campestre L. — Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.).

- E. maritimum* L. — Azn. BSBF 44: 170; Degen 45: 68. — E: (Azn.); Küttschük-Tschekmedsche, Strand. — A: (Azn.); Riva (Degen).
Lagoecia cuminoides L. — ? — Fanaraki (W. 47).
Bupleurum divaricatum Lam. ssp. *aristatum* (Bartl.) Briqu. — Fanaraki (W 46).
B. flavidum Forsk. — E: San Stefano; Konstantinopel (W 239).
B. flavidum Forsk. var. *thraceum* (Vel.) H. Wolff — Azn. BSBF 46: 142 (als Art). — E: Zwischen Floria und Makri-Köj. — A: Tusla. (Sämtlich Azn.).
B. Fontanesii Guss. — Azn. BSBF 46: 153; BSBF 44: 170 (als *B. Odontites* DC.) E: (Azn.); Balukli; Jedi-Kule.
B. junceum L. — Azn. MBL 2: 143. — E: Balabandere, Böyükliman (Azn.).
B. lancifolium Hornem. — Azn. BSBF 44: 180 (als *B. protractum* Hoffmg. & Lk.) E: (Azn.); Balukli; Jedi-Kule; Konstantinopel (W 240). A: (Azn.).
B. rotundifolium L. — E: Konstantinopel (W 240).
B. tenuissimum L. — Azn. BSBF 44: 170. — E, A.
Apium graveolens L. — Azn. MBL 12: 165 — Degen 45: 68. — E: Böyük-Dere (Azn.). — A: Riva, Düne. — Symplegiaden (Degen).
Sison Amomum L. — Azn. BSBF 44: 170. — E, A.
Ammi maius E. — Azn. BSBF 44: 170 — E: (Azn.); Kilia.
Falcaria vulgaris Bernh. — Azn. BSBF 44: 170 (als *F. Rivini* Host). — E, A.
Bunium ferulaceum S. & S. — Azn. BSBF 40: 170 (als *B. ferulaceum* Desf.). — A: (Azn.); Kartal, baumlose Ebene; Tusla, Felddraine.
Pimpinella Saxifraga L. — Azn. BSBF 44: 170. — E.
Berula erecta (Huds.) Coville — Azn. BSBF 46: 142 (als *B. angustifolia* Koch), — E: San Stefano (Azn.).
Orithrum maritimum L. — Beg. 222. — H. M. 175. — Degen 45: 68. — A: Jum Burnu, Dünensand; Prinkipo (H. M., Beg.). — Symplegiaden (Degen).
Oenanthe angulosa Gris. — E: Kilia; Rumeli-Fanar; Konstantinopel (W 43).
O. pimpinelloides L. — Azn. MBL 12: 165. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane. — A: Armeni-Köj.
Foeniculum piperitum DC. — Azn. MBL 2: 144. — E: San Stefano; Kalender (Sämtl. Azn.).
Lophosciadium meoides (L.) Calestani — Azn. BSBF 44: 170 (als *Ferulago m.* Boiss. var. *Thirkeana* Azn. = *F. Thirkana* Boiss.). E: (Azn.); Therapia, Sommerpalast; Dschendere, Wald; Bagtsche-Köj; Rumeli-Fanar. — A: (Azn.); Antigoni (W 42).
Opapanax hispidus (Friv.) Gris. — Azn. BSBF 44: 171 (als *O. orientalis* Boiss.). — A.
Peucedanum obtusifolium S. & S. — Degen 45: 67 (als *Malabaila o.* [S. S.] Boiss.). — E: Dünen bei Kilia (leg. Aznavour). — A: Zwischen Anatoli-Fanar und Riva (Degen); Jum Burnu.

- Pastinaca sativa* L. var. *silvestris* (Mill.) — Azn. BSBF 44: 171 (als Art). — E.
- Tordylium apulum* L. — E: San Stefano; Jedi-Kule.
- T. byzantinum* (Azn.) Hay. — Azn. BSBF 44: 170 (als *Ainsworthia* b. Azn.). — E: (Azn.); Aivan-Serai; Konstantinopel (W 49). — A: (Azn.); Kandilli.
- Daucus Broteri* Ten. — Azn. MBL 2: 144. — A: Okranli (Azn.).
- D. Carota* L. ssp. *carota* (L.) Thell. — Beg. 222 (als *D. Carota*). — A: Adam-Pol, Alem-Dagh (ad var. *foliosum* (Guss.) Paoletti ver-gens. — det. Onno); Prinkipo (Beg.).
- D. Carota* L. ssp. *maximus* (Desf.) Thell. — Azn. MBL 2: 144 (als Art). — E: Therapia; Kilia; Rumeli-Fanar, Meeresufer (det. Onno). — A: Pendik (Sämtl. Azn.).
- D. pumilus* (Gou.) Ball. — Azn. BSBF 44: 171 (als *Orlaya maritima* Koch). — E.
- D. setulosus* Guss. — Azn. BSBF 44: 171. — Degen 45: 68. (beide als *D. guttatus* Sibth.). — E: (Azn.); Kilia (det. Onno); — A: (Azn.); Riva (Degen).
- Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. — Azn. BSBF 44: 171. E, A.
- O. platycarpa* (L.) Koch. — Azn. BSBF 44: 171. — E; (Azn.). — A: (Azn.); Beikos, Josua-Dagh; Brussa, sonniges Flussufer.
- O. platycarpa* (L.) Koch var. *elatior* Azn. — Azn. BSBF 46: 143. — A: Yakadschik (Azn.).
- Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. — A: Brussa, Straße nach Ak-Dschellan.
- Caucalis daucoides* L. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane. — A: Prinkipo (W 44).
- Torilis arvensis* (Huds.) Lk. ssp. *purpurea* (Ten.) Hay. — E: Wald bei Bagtsche-Köj; Konstantinopel (W 242). — Bei Hayek Prodr. Fl. Balc. I, 1057 für Thrazien nicht angegeben.
- T. leptophylla* (L. f.) Rchb. — Azn. MBL 2: 144 (als *Caucalis* l. L. var. *peduncularis* Boiss.). — A: Kartal (Azn.); Antigoni (W 119).
- Physocaulis nodosa* (L.) Tausch — Azn. MBL 12: 165. — E: Zwischen Dschendere und Agaz-Aga (Azn.).
- Chaerophyllum byzantinum* Boiss. — Azn. MBL 2: 143 (var. *hirtum* Azn. und var. *glabratum* Azn.). — E: Kilia; am Bosporus (Azn.).
- Anthriscus Cerefolium* (L.) Hoffm. var. *trichospermus* (Schult.) Endl. — Azn. BSBF 44: 170. — A.
- A. nemorosus* M. B. f. *anatolicus* Boiss. — A: Bithynischer Olymp, Ak-Dschellan.
- A. vulgaris* Pers. — Azn. BSBF 44: 170. — E.
- Scandix australis* L. — Azn. BSBF 44: 170. — A.
- S. australis* L. ssp. *balcanica* Vierh. — A: Kartal; Pendik (?).
- S. grandiflora* L. — Azn. BSBF 44: 170. — E.
- S. iberica* M. B. — Azn. MBL 12: 165. — E: Schischli.
- S. pecten Veneris* L. — Azn. BSBF 46: 142. — E: San Stefano (Azn., f. *genuina* Azn. und var. *brevirostris* Boiss. ?); Orta-Köj; Böyük-Dere (Azn. f. *polycarpa* Azn.). — A: Feuerberg; Kartal (Azn., f. *genuina*); Maltepe (Azn., var. *brevirostris*); Pendik (Azn., f. *polycarpa*).

Conium maculatum L. — Azn. MBL 2: 144 (var. *leiocarpum* Boiss.).
— E: Jedi-Kule, Stadtmauer; Skumru-köj (Azn.).

Smyrnium Olausatum L. — E: San Stefano. — A: Tusla, an Wegen.
— ? ; Pitta (W 41). — Von Hayek Prodr. Fl. Balk. 1: 1070 für
Thrazien nicht angegeben.

Hippomarathrum cristatum Boiss. — Azn. BSBF 44: 170. — A.

Colladonia triquetra (Vent.) DC. — Degen 45: 68. — E: Ufer des
Bosporus (Degen).

Echinophora tenuifolia L. — E: San Stefano, Bahndamm.

Coriandrum sativum L. — Azn. BSBF 44: 170. — E.

Bifora radians M. B. — Azn. MBL 2: 144. — A: Kurd-Köj (Azn.).

B. testiculata (L) DC. — A: Tusla, im Getreide.

Plumbaginaceae.

Plumbago europaea L. — A: Dschamlidscha, an der Straße.

Goniolimon dalmaticum (Presl.) Rchb. — Azn. BSBF 44: 174. — E.

G. collinum (Gris.) Boiss. — Azn. MBL 12: 177. — E: Skumruköj;
Domusdere (Beide Azn.).

Statice Limonium L. — E: San Stefano, Sumpf. — A: Dünensand bei
Jum Burnu.

S. oleifolia (Mill.) S. & S. — Beg. 221 (als *S. virgata* Willd.). —
A: Prinkipo (Beg.).

S. sinuata L. — A: Kartal, gegenüber von Prinkipo.

Ericaceae.

Arbutus Unedo L. — Azn. MBL 3: 9 (var. *ellipsoidea* Azn.); MBL 12:
174 (var. *turbinata* Boiss.). — H. M. 176. — Krause 2: 29 und
564. — Beg. 221. — E: Belgrader Wald, sonnige Abhänge; Bos-
porus (Krause); Yenimahalle (Azn.). — A: Prinkipo, sonnige
Abhänge (Nemetz, H. M., Beg., Azn.). Antigoni (W 54).

Calluna vulgaris (L.) Hull. — E: Belgrader Wald, sonnige Hügel; Wald
bei Bagtsche-Köj.

Erica arborea L. — H. M. 177. — Beg. 221. — Krause 2: 566. —
E: Wald bei Dschendere. — A: Prinkipo (H. M., Beg.); Dscham-
lidscha, Bulgurlu; Bithynischer Olymp, 1000 m; Antigoni (W 52).

E. verticillata Forsk. — Beg. 221. Krause 2: 29 und 566. — E: Bel-
grader Wald; Bosporus (Krause); Rumeli-Fanar. — A: Dscham-
lidscha; Prinkipo, sonnige Abhänge (Nemetz, Beg.).

Bruckenthalia spiculifolia (Salb.) Rchb. — A: Bith. Olymp (W 51).

Primulaceae.

Primula vulgaris Huds. ssp. *rubra* (S. & S.) Hay. — E: Dschendere. —
A: Dschamlidscha; Bithynischer Olymp, Laubwald bei 1000 m.
(fl. *albis*).

Cyclamen hiemale Hildeb. — Azn. MBL 12: 174. — E: Böyük-Dere;
zwischen Dschendere und Belgrad-Köj. — A: Alemdagh; Adam-
Pol. (Sämtl. Azn.).

Lysimachia atropurpurea L. — Azn. MBL 12: 174. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Bithynischer Olymp, Straße bei Ak-Dschellan; Kurhali-Dere (Azn.).

L. punctata Jacq. — Azn. BSBF 44: 173. E: (Azn.); Böyük-Dere, feuchter Straßengraben; Rumeli Fanar, Bachufer. — A: (Azn.).

Asterolinum Linum stellatum (Lk.) Duby — Azn. BSBF 44: 173. — A.

Anagallis arvensis L. — Azn MBL 12: 174 (var. *micrantha* Gren. & Godr.). — Beg. 221. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane-Köj (Azn.) — A: Dschamlidscha; Böyük-Dschamlidscha (Azn.); Prinkipo (Beg.) Kütschük-Gök-Su-Tal.

A. arvensis L. var. *latifolia* (L.) Hay. — E: Böyük-Dere.

Samolus Valerandi L. — Azn. BSBF 44: 173. — Degen 45: 68. — E, A (Azn.). — Symplegiaden (Degen).

Styracaceae.

Styrax officinalis L. — A: Bithynischer Olymp, 900 m.

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L. — Krause 2: 31. — E: Konstantinopel, Stadtmauer; Orta-Köj. — A: Bulgurlu-Dagh bei Skutari (Krause).

C. Cantabrica L. — Azn. MBL 12: 173. — E: Orta-Köj; Schischli, trockene Hügel (Nemetz, Azn.). — A: Tschengel-Köj; Kütschük-Gök-Su; Anatol-Hissar; Elmali (Azn.).

C. pentapetaloides L. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.). A: (Azn.); Tusla. — In Hayek Prodr. Fl. Balc. 2: 39 für Thrazien nicht angegeben.

C. persicus L. — E: Kilia, Düne.

Calystegia silvestris (Willd.) Röm. & Schult. — E: Orta-Köj.

C. Soldanella (L.) R. Br. — Azn. BSBF 44: 173. — Degen 45: 68 (als *Convolvulus S.*) — E: (Azn.). — A: (Azn.); Riva (Degen).

Cuscutaceae.

Cuscuta breviflora Vis. — E: Dschendere, Kiat-Hane-Su.

C. Cesatiana Bertol. — Azn. BSBF 46: 144 (als *C. obtusiflora* H. B. K. var. *Cesatiana* Arc.). — E: Dschendere, auf *Polygonum Persicaria* (Azn.).

C. epithymum L. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

C. laxiflora Azn. — Azn. MBL 4: 137. — E: Zwischen Jedi-Kule und Makri-Köj, auf *Vicia ervilia* und *Orlaya platicarpus* (Azn.).

C. monogyna Vahl. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

Boraginaceae.

Tournefortia Arguzia (L. f.) R. & Sch. — Degen 45: 68 (als *T. sibirica* L.); Azn. BSBF 44: 173. E: (Azn.) Ufer des Bosporus (Degen); Rumeli-Fanar, Meeresküste.

Heliotropium europaeum L. — Beg. 221. — E: Orta-Köj; Konstantinopel (W 219). — A: Prinkipo (Beg.).

- H. supinum* L. — Azn. BSBF 46: 144. — A: Zwischen Kartal und dem Hügel Drakos bei Maltepe (Azn.).
- Cynoglossum creticum* Mill. — Azn. BSBF 44: 173 (als *C. pictum* Ait.). — E: (Azn.); Konstantinopel (W 64). — A: (Azn.); Anatol-Hissar; Brussa, Weg zu den Bädern; Antigoni (W 216).
- Lappula echinata* Gilib. — Azn. MBL 12: 175. — E: Ali-Beg-Köj. — A: Prinkipo (Beide Azn.).
- Asperugo procumbens* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.); San Stefano, Bahndamm. — A: (Azn.).
- Symphtym orientale* L. — E: Konstantinopel (W 213). — ? Serai-Burnu.
- S. pseudobulbosum* Azn. Bull. Hb. Boiss. 2. Ser., 3, 1903: 588 — Azn. BSBF 44: 173 (als *S. bulbosum* Schimp.); MBL 12: 175. — A: Akbaba; Beikos, Gök-Suju (Sämtl. Azn.).
- S. tuberosum* L. — Bornm. 32. — E: Therapia; Belgrader Wald (Bornm., Nemetz). — A: Armeni-Köj.
- Borago officinalis* L. — E: San Stefano, verwildert auf Wiesen und Feldrainen; Konstantinopel (W 309).
- Trachystemon orientale* (Willd.) Don. — Bornm. 33 (als *Psilostemon* o.). — E: Dschendere, Wald, Belgrader Wald (Bornm., Nemetz); Wald bei Bagtsche-Köj, Therapia. — A: Bithynischer Olymp, Laubwald bei 1000 m; Wald bei Beikos.
- Anchusa arvensis* (L.) M. B. — Azn. BSBF 44: 173. — E.
- A. hybrida* Ten. — Degen 45: 68 (als *A. officinalis*) — E: San Stefano (W. 214); Makri-Köj (W 308). — A: Riva, Düne. — Symplegiaden (Degen). — Hierher wohl auch die von Degen l. c. als *A. obliqua* Vis. erwähnte Pflanze von Riva.
- A. italicica* Retz. — Azn. MBL 12: 175. — E: Zwischen San Stefano und Jedi-Kule (Azn.). — A: Pendik (Azn.); Jum Burnu. ? Messarburnu.
- A. thessala* Boiss. & Spr. — Azn. BSBF 44: 173. — E.
- Nonnea nulla* (L.) DC. — E: San Stefano.
- N. ventricosa* Gris. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.); Konstantinopel (W 220).
- Myosotis¹⁾ arvensis* (L.) Hill. — Azn. MBL 4: 138. — E: Halkali (Azn.). — A: Yakadschik (Azn.); Bithyniseher Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- M. collina* Hoffm. — E: Wald bei Bagtsche-Köj; Therapia; Kütschük-Tschenkmedsche (W 58). — A: Kaisch-Dagh; Dschamlidscha; Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m; Antigoni (W 60).
- M. idaea* Boiss. & Heldr. — Azn. BSBF 44: 146 (typ.); MBL. 4: 138 (var. *boeotica* Reut.). — E: Kiat-Hane-Köj (Azn.).
- M. idaea* Boiss & Heldr. var. *cadmæa* (Boiss.). — E: Kiat-Hane, Hügel gegen Schischli; Dschendere. — ? Ejub (W. 218).
- M. lingulata* Lehm. — Azn. BSBF 46: 146 (als *M. caespitosa* Schultz). — E: Kütschük-Tschenkmedsche. — A: Beikos (beide Azn.).

¹⁾ Die von Nemetz gesammelten Exemplare wurden von A. E. Wade, Cardiff, bestimmt. Die Nomenklatur folgt A. E. Wade.

- M. lithospermifolia* Hornem. — Azn. BSBF 46: 146. — E: Zwischen Domus-Dere und Skumru-Köj (Azn.). — A: Bithynischer Olymp, 2200 m. Zu letzterem Exemplar schreibt A. E. Wade: „ . . ziemlich jung, aber ähnlich den Exemplaren, die Vester-gren als *M. lithospermifolia* (Willd.) Hornem. bestimmt hat.“
- M. litoralis* Stev. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.). — A: Tusla.
- M. pusilla* Lois. — E: Kütschük-Tschekmedsche. — A: Kaisch-Dagh.
- M. scorpioides* L. — E: Konstantinopel (W 61).
- M. sylvatica* Hoffm. — E: Domusdere; Düne. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- Lithospermum apulum* Vahl. — Azn. BSBF 44: 175. — A.
- L. arvense* L. — San Stefano; Konstantinopel (W 212).
- L. incrassatum* Guss. var. *Leithneri* (Heldr. & Sart.). — Azn. MBL 4: 138 (als Art). — E: Kumbaschi zwischen Skumru-Köj und Domus-Dere (Azn.).
- L. purpureo-coeruleum* L. — Azn. MBL 4: 138. — E: Halkali (Azn.), A: Okranli (Azn.); Brussa, Weg zu den Bädern; Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan. — ? Galataria (W 57).
- Onosma erectum* S. & S. — Azn. MBL 4: 137. — E: Hügel bei Halkali (Azn.).
- O. pallidum* Boiss. — E: Kiat-Hane; Schischli-Kiat-Hane; Konstantinopel (W 62). — A: Kartal.
- O. proponticum* Azn. — Azn. BSBF 46: 145. — E: Halkali; Safra-Köj (beide Azn.).
- O. tauricum* Willd. — Azn. MBL 4: 137 (als *O. laconicum* Boiss. & Orph.). — E: Jedi-Kule, Stadtmauern; — A: Tusla, Feldrainé (Nemetz, Azn.).
- Cerinthe maior* L. — E: Balukli, im Getreide; Konstantinopel (W 63).
- C. minor* L. — MBL 12: 175. — E: Konstantinopel (W 215). — A: Bendik; Tusla; Dolaiba; zwischen Beikos und Akbaba (sämtl. Azn.).
- C. minor* L. var. *hispida* Turrill. — E: San Stefano. — A: Aidos-Dagh bei Kartal; Brussa, Weg zu den Bädern.
- Echium italicum* L. var. *Biebersteinii* Lacaita. — E: Orta-Köj; Schischli. A: Dschamlidscha.
- E. plantagineum* L. — Bornm. 31. — Degen 45: 68. — E: Schischli; Dschendere, Belgrader Wald (Bornm.); Konstantinopel (W 59). — A: Brussa, Spitalberg. — Symplegiaden (Degen).
- Cervia disperma* (L.) Hay. — Azn. MBL 4: 138 (als *Rochelia d.* Stapf). — A: Pendik (Azn.).

Solanaceae.

- Lycium europaeum* L. — Azn. BSBF 46: 146. — Krause 2: 573. — A: Tusla (Nemetz, Azn.).
- L. halimifolium* Mill. — Azn. BSBF 46: 146 (als *L. vulgare* Dun.). — E: Konstantinopel, wüste Plätze; Schischli, kult. (Azn.).
- Hyoscyamus albus* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.). — A: Antigoni (Nemetz, Azn.).
- H. niger* L. — A: Armeni-Köj.
- Physalis Alkekengi* L. — A: Brussa, Weg nach Ak-Dschellan.

- Solanum alatum* Mnch. — Azn. BSBF 44: 173 (als *S. miniatum* Bernh.). — E: (Azn.): Konstantinopel, wüste Plätze. — A: (Azn.).
S. dulcamara L. var. *indivisum* Boiss. — Azn. BSBF 44: 173. — E.
S. Lycopersicum L. var. *esculentum* (Mill.) Hay. — E: Orta-Köj, Bachufer.
S. nigrum L. — Beg. 221. — E: Belgrader Wald, Weg zum Bend. — A: Prinkipo (Beg.).
Datura Stramonium L. — A: Böyük-Gök-Su, Damm der Wasserwerke.

Scrophulariaceae.

- Verbascum*¹⁾ *Blattaria* L. — Azn. MBL 4: 139 (als var. *repandum* [W.] Arc.). — E: Therapia (Azn.).
V. Blattaria L. var. *brevipedicellatum* Hal. — E: San Stefano, Bahndamm.
V. Haussknechtii Heldr. var. *Degeni* (Hal.) Murb. Monogr. 330. — Azn. MBL 4: 138 (als Art); Azn. BSBF 44: 173. — Degen 45: 68. — E: Kilia, Sandküste (Azn.); Ufer des Bosporus (Degen).
V. phlomoides L. — Azn. BSBF 44: 173. — E: Orta-Köj. — A: (Azn.).
V. pinnatifidum Vahl. — Kütschük-Tschekmedsche, Düne; Floria (W 157).
V. pulverulentum Vill. — Azn. BSBF 44: 173. — E.
V. sinuatum L. — Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; San Stefano, Bahndamm.
V. xanthophoeniceum Gris. — A: Aidos-Dagh bei Pendik und bei Kartal; Obstgärten bei Pendik.
Celsia bugulifolia (Lam.) Chaub. & Spach. — Bornm. 34; — Azn. MBL 12: 175 (var. *flavida* Azn.) — E: Wald von Belgrad (Bornm.); Halkali (Azn.). — A: Beikos, sonnige Hügel; Dschamlidscha; Alem-Dagh; Aidos-Dagh, Gestrüpp. Antigoni (W 159, 299).
C. Rechingeri Murbeck. — E: Böyük-Dere (Barbey ex Murb. Monogr. Cels. p. 106.)
Antirrhinum maius L. var. *angustifolium* Chav. — E: Stadtmauern bei Jedi-Kule.
A. Orontium L. — Azn. MBL 12: 175. — E: Therapia (Azn.); zwischen Schischli und Flamer (Azn.); Konstantinopel (W 302). — A: Brussa, Weg zu den Bädern.
A. tortuosum Bosc. — E: Konstantinopel, Stadtmauer.
Linaria chalepensis Mill. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.) — A: Tusla, im Getreide.
L. genistifolia (L.) Mill. — E: Orta-Köj, Felddraine, Gebüsche; Böyük-Dere, Wiese; Konstantinopel (W 296). — A: Adam-Pol, Alem-Pol, Alem-Dagh; Böyük-Gök-Su; Antigoni (W 158).
L. odora M. B. — E: Kilia, Düne.

¹⁾ Die von Nemetz gesammelten Exemplare wurden von S. Murbeck, Lund, bestimmt. Die Nomenklatur folgt Murbeck, vergl. S. Murbeck: Monographie der Gattung *Verbascum* (Lund 1933).

- Kickxia commutata* (Bernh.) Fritsch. — E: Therapia, Sommer-Palast.
- K. Elatina* (L.) Dum. ssp. *Sieberi* (Rchb.) Hay. — Azn. BSBF 46: 146
(als *Linaria* S.). — E: Böyük-Dere; Therapia. (Azn.). — A: Antigoni (W. 159).
- K. spuria* (L.) Dum. — Azn. MBL 12: 175 (als *Linaria* s.). — E: Makri-Köj. (Azn.).
- Scrophularia canina* L. — E: Kiathane (W 298). — A: Brussa, Weg zu den Bädern. — ? Messarburnu.
- S. Scopolii* Hoppe. — E: Böyük-Dere; Konstantinopel (W 21). — A: Bithynischer Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- S. Scopolii* Hoppe var. *smyrnacea* Boiss. — A: Tusla.
- Gratiola officinalis* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.
- Veronica acinifolia* L. — E: Belgrader Wald; Rumeli-Hissar, Wege, — A: Bithynischer Olymp, 1000 m.
- V. Anagallis* L. — Konstantinopel, Stadtmauern. — A: Tschengel-Köj; Antigoni (W 196).
- V. anagalloides* Guss. — Azn. MBL 4: 140. — E: Silihdar-Aga (Azn.).
- V. arvensis* L. — Azn. MBL 4: 141 (var. *polyanthos* [Thuill.] Math.). — E: Kilia, Grasflächen am Meereseufer; Taschkischla (Azn.); Ejub (Azn.). — A: Gök-Suju (Azn.).
- V. austriaca* L. — Azn. BSBF 44: 173. — A.
- V. chamaedrys* L. — Azn. BSBF 46: 146 (typ. und var. *pilosa* [Schm.] Benth.). — E: Böyük-Dere; Rumeli-Feneri (Azn.); R. Kavak Azn., W 19). — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan und bei 1000 m.
- V. cymbalaria* L. — Azn. MBL 4: 141 (typ. und var. *panormitana* Tin.) — H. M. Ann. Nat. Mus. Wien 27, 1913: 406. — E: Kiat-Hane; Domusdere; Schischli; K. Flamur bei Pera (Azn.); Hass-Köj. — A: Prinkipo (H. M.).
- V. hederifolia* L. — A: Antigoni (W 195, 303).
- V. montana* L. — E: Belgrader Wald.
- V. pectinata* L. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Kartal, Bahndamm; Pendik (Nemetz, W 20); Yakadschik (W. 217).
- V. polita* Fr. — Azn. BSBF 44: 173 (als *V. didyma* Ten. — E: (Azn.); Konstantinopel).
- V. prostrata* L. — Azn. MBL 4: 140. — E: Halkali (Azn.).
- V. pumila* Clarke — Azn. BSBF 46: 146 (als *V. pontica* Vel.). — E: Böyük-Halkali (Azn.).
- V. scutellata* L. — Azn. MBL 4: 140. — A: Sumpfränder bei Ochanli (Azn.).
- V. serpyllifolia* L. — Azn. MBL 4: 141 (var. *glandulosa* Wirtg.). — E: Böyük-Dere (Nemetz, Azn.); Wald bei Bagtsche-Köj; Therapia (Azn.). — A: Wiesen bei Beikos; Gök-Suju (Azn.).
- V. Tournefortii* Gmel. — E: Orta-Köj; Kiat-Hane; Hass-Köj. — A: Brussa, sonniges Flußufer.
- V. verna* L. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- Digitalis ferruginea* L. — Azn. MBL 4: 140. — A: Hügel am Bosporus (Azn.); Böyük-Gök-Su, Damm der anatolischen Wasserleitung.
- D. lanata* Ehrh. — Azn. MBL. 4: 140. — E: Halkali (Azn.).

Bellardia Trirago (L.) All. — E: Jedi-Kule; Konstantinopel (W 281).
— A: Kenan-Tepe bei Vany-Köj.

Parentucellia latifolia (L.) Car. — Bornm. 32 (als *Eufragia l.* [L] Gris.).
— E: Dschendere; San Stefano; Belgrader Wald (Bornm.);
süße Wasser (W. 301). — A: Beikos; Bithynischer Olymp.

Euphrasia tatarica Fisch. — A: Aidos-Dagh, Kartal.

Lathraea squamaria L. — Azn. BSBF 44: 173. — E.

Orobanchaceae.

Orobanche gracilis Sm. — Azn. BSBF 44: 173 (als *O. cruenta* Bert.). — A.
O. hederae Duby. — Azn. MBL 12: 175. — E: Sultan-Suju. — A: To-
kat-Deressi (beide Azn.)

O. minor Sutt. — E: Konstantinopel, Stadtmauer.

O. Mutelii F. Schultz. — A: Kartal, an der Eisenbahn.

O. nana Noë. — E: Böyük-Dere; Kütschük-Tscheckmedsche. — A:
Tusla, Wiesen; Josua-Dagh bei Beikos.

Verbenaceae.

Verbena officinalis L. — E: Schischli.

V. supina L. — Azn. BSBF 46: 147. — E: Jedi-Kule (Azn.).

Lippia nodiflora L. — Azn. MBL 12: 175 (subspont. et cult.) — Beg.
221 (var. *sarmentosa* Spr.) — A: Prinkipo (Beg.).

Vitex agnus castus L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.

Labiate.

Ajuga chia (Poir.) Schreb. — E: San Stefano; Makri-Köj (W 300). —
A: Pendik, Obstgärten.

A. Laxmanni (L.) Benth. — A: Bithynischer Olymp, Gebüsch bei
Ak-Dschellan.

A. orientalis L. — A: Bithynischer Olymp.

Teucrium Chamaedrys L. — E: Schischli; Makri-Köj (W 304). —
A: Beikos, sonnige Stellen; Antigoni (W 68).

T. cordifolium Čel. — Azn. 5: 156. — E: Konstantinopel (W 277). —
A: Juschadagh; Tschataldag (beide Azn.).

T. divaricatum Sieb. — H. M. 184. — A: Prinkipo (Nemetz, H. M.);
Antigoni (W 72).

T. lamiiifolium Urv. — Azn. BSBF 46: 147 (als *T. Degenianum* Azn.).
— A: Pendik (Azn.).

T. polium L. — Degen 45: 68. — Azn. MBL 12: 177 (var. *vulgare* und
f. *intermedium* Čel. [als var. *angustifolium* Benth.]). — E: San
Stefano, Strand (Nemetz, W 73); Kilia, Düne (Nemetz, Azn.);
Makri-Köj (Azn.). — A: Riva (Degen).

T. scordioides Schreb. — Azn. BSBF 44: 174. — E.

Scutellaria albida L. — E: Rumeli-Fanar. — A: Böyük-Gök-Su; A: An-
tigoni (W 284).

- S. hastifolia* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.
- Lavandula cariensis* Boiss. — E: Schischli. — A: Dschamlidscha.
- L. spica* L. — A: Prinkipo, vix spont.
- L. Stoechas* L. — H. M. 184; Beg. 221. — E: Böyük-Dere. — A: Kaisch-Dagh; Dschamlidscha; Prinkipo (H. M., Beg.); Antigoni (W 297).
- Marrubium vulgare* L. — Azn. MBL 12: 176. — E: Orta-Köj; zwischen Schischli und Kiathane-Köj (Azn.); Konstantinopel (W 280).
- Sideritis montana* L. — Azn. BSBF 44: 173 (var. *comosa* Boiss. mit f. *xanthocoma* Azn. und f. *erythrocoma* Azn.). MBL 12: 176 (typ. und var. *cryptantha* Boiss.). — E: (Azn.); San Stefano, Saat. — A: (Azn.); Fener-Bagtsche (W 66).
- S. romana* L. — Azn. BSBF 44: 173. — H. M. 184. — E: (Azn.), — A: (Azn.); Prinkipo (H. M.). — Wohl durchaus die folgende Unterart!
- S. romana* L. ssp. *eu-romana* Hay. — E: Rumeli-Fanar (leg. Degen). — A: Riva (leg. Degen); Anatol-Hissar, Klein-Göksu.
- Glechoma hederacea* L. — A: Beikos, Wald bei Sultan-Tschiflik.
- Prunella laciniata* L. — E: Schischli. — ? Messarburnu. — ? Jakadschik (W 154).
- P. laciniata* × *vulgaris*. — E: Schischli. — A: Alem-Dagh.
- P. vulgaris* L. — E: Bagtsche-Köj. — A: Wald bei Beikos; Armeni-Köj.
- Phlomis pungens* Willd. — Azn. BSBF 44: 174 (als *P. Herba renti* L.) — A.
- Lamium amplexicaule* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.); San Stefano. — A: (Azn.); Tusla. — ? Galataria (W 71).
- L. amplexicaule* L. var. *Nemetzii* Azn. — Azn. BSBF 46: 174. — E: Kütschük-Tscheckmedsche (Nemetz, Azn.).
- L. bithynicum* Benth. — A: Bithynischer Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- L. Galeobdolon* (L) Cr. — E: Belgrader Wald.
- L. purpureum* L. — E: Konstantinopel (Nemetz, W 306); San Stefano; Orta-Köj; Rumeli-Hissar. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- L. purpureum* L. var. *Axnarourii* Gandgr. — Azn. BSBF 46: 147. — E: Flamur. — A: Skutari (beide Azn.).
- Wiedemannia orientalis* Fisch. & Mey. — Azn. MBL 12: 177. — E: Schischli. — A: Pendik (beide Azn.).
- Ballota nigra* L. — Beg. 221 (var. *meridionalis* Beg.). — E: Orta-Köj; Kütschük-Tscheckmedsche. — A: Prinkipo (Beg.). — Die Exemplare von Nemetz stimmen in der Länge der Kelchzähne mit ssp. *ruderale* (Sw.) Briq. überein, doch sind die Zähne zurückgeschlagen wie bei ssp. *foetida* (Lam.) Hay.
- Stachys annua* L. — E: Konstantinopel (W 69; W 307 = var. *ciliicica* Boiss.).
- S. arvensis* L. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
- S. Haussknechtii* (Uechtr.) Hay. — Azn. MBL 4: 142 (als *Betonica H.*). — A: Tschataldagh. (Azn.).
- S. maritima* L. — Azn. BSBF 44: 174. — Degen 45: 68. — E: Kilia, Düne. — A: (Azn.); Riva (Degen).
- S. patula* Gris. — Azn. MBL 4: 142. — E: Dünensand bei Kilia (Azn.). — A: Jum Burnu, Sanddüne gegen Riva; Riva (Azn.).

- S. spinulosa* S. & S. — A: Pendik, Bahndamm; Kartal, Straßengraben.
- S. Thirkei* C. Koch. — E: San Stefano, Raine; Orta-Köj: Therapia; Schischli: Konstantinopel (W 74, 282). — Über diese Art vergleiche Rechinger fil., Ann. Nat. Mus. Wien 48: 167—178 (1937).
- Salvia Aethiopis* L. — Azn. BSBF 44: 173 — E: (Azn.); San Stefano — Galataria (W 279). — A: (Azn.).
- S. Forskählei* L. — det. E. Peter-Stibal. — E: Belgrader Wald; Konstantinopel (W 70). — A: Adam-Pol (f. *byzantina* Clem.).
- S. grandiflora* Ettling. — Azn. MBL 12: 176. — Degen 45. 68. — E: Mavromolus (Azn.); Bosporus (Degen). — A: Pendik (Azn.).
- S. Horminum* L. — Degen 45: 68. — E: Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; Konstantinopel (W 76). — A: Oestl. von Riva (Degen).
- S. pinnata* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- S. pratensis* L. — E: Orta-Köj, trockene Wiese.
- S. sclarea* L. — Azn. MBL 4: 142. — A: Prinkipo (Azn.).
- S. Verbenaca* L. — E: San Stefano; Domusdere, Gebüsch; Belgrader Wald; Kiathane (W 305). — A: Kartal, Bahndamm.
- S. verticillata* L. — Azn. MBL 12: 176 (ssp. *amasiaca* [Freyn & Bornm.] Bornm.). — A: Beikos, Waldwiese; Prinkipo, Nizam (Azn.).
- S. virgata* Jaq. — Azn. MBL 12: 176. — Beg. 221. — E: San Stefano, Strand; Rumeli-Fanar. — A: Aidos-Dagh; Scutari (Azn.); Prinkipo (Beg.).
- S. viridis* L. — A: Pendik, Felddraine; Tusla.
- Melissa officinalis* L. — A: Antigoni (W 75).
- Satureia hortensis* L. — Azn. BSBF 46: 147. — A: Kartal (Azn.).
- Micromeria myrtifolia* Boiss. & Hohen. — Azn. MBL 12: 176. — A: Zwischen Pendik und Dolaiba (Azn.).
- M. praecox* L. — E: Stadtmauer bei Jedi-Kule.
- Calamintha exigua* S. & S. — Azn. BSBF 44: 173 (als *graveolens* Bth.). — E: (Azn.); Böyük-Dere; San Stefano (W 65). — A: (Azn.); Pendik. — Die Exemplare von Nemetz wurden von K. Fritsch auf der Etikette als neue Art bezeichnet. Ich halte sie jedoch nur für eine stark und lang behaarte Form von *C. exigua*, wie sie ähnlich auch von der Krim bekannt sind. Vergl. *S. cana* Steven.
- C. Nepeta* (L.) Savi. — Beg. 221, H. M. 188 (beide als *Satureia Nepeta* [L.] Scheele). — E: Belgrader Wald; San Stefano, ausgetrockneter Sumpf. — A: Prinkipo, (Beg., H. M.).
- C. vulgaris* (L.) Druce. — A: Beikos, sonnige Stellen im Wald.
- Thymbra spicata* L. — Azn. MBL 12: 176. — E: Jedi-Kule (Azn.).
- Origanum vulgare* L. ssp. *eu-vulgare* Hayek. — E: San Stefano, Bahndamm; Kandili (W 155).
- Thymus*¹⁾ *Callieri* Borb. — Azn. MBL 4: 142. — E: Schischli; Kiat-Hane-Köj; Halkali. — A: Tusla; Maltepe (sämtl. Azn.).
- S. Callieri* Borb. var. *dolosus* Ronn. — A: Dschamlidscha (Nemetz, W 67).

¹⁾ Gattung *Thymus* bearbeitet von Karl Ronniger, Wien.

T. moesiacus Vel. var. **turcicus** Ronn., nov. var.

Rami floriferi pilis brevissimis patentibus 0.03—0.06 mm longis paulum tantum deorsum flexis densissime obsiti. Folia sursum manifeste increscentia, infima parva 3—4 mm longa linearia dense conferta, media et superiora 7—9 mm longa, 1,5—2 mm lata, glabra, nervis quinque subtus valde prominentibus, margine ad tertiam vel dimidiam partem ciliata, lanceolata, antice rotundata, in medio vel supra medium latissima. Inflorescentia capitata. Calyx parvus 3 mm longus dorso glaber, praeterea dense et longe pilosus, dentes superiores lanceolati, longe ciliati.

E: Schischli (mit Galle von *Eriophyes Thomasii*); Böyük-Dere. — A: Pendik.

Die neue Varietät steht dem *T. moesiacus* var. *microcalyx* (Deg. & Urum.) Ronn. in Hayek, Prodr. 2: 355 am nächsten, unterscheidet sich aber durch die äußerst kurze Behaarung der blühenden Aeste und durch die kräftigen Blattnerven. Wenn ich die var. *microcalyx* erwähne, so kann ich nicht verschweigen, daß der Name dieser Rasse geändert werden muß. Borbás beschrieb in seinen „Symbolae ad Thymos Europae“ pag. 90 einen *Thymus Chaubardii* var. *subisophyllus*. Durch die Güte Prof. Bornmüllers erhielt ich Originalexemplare dieser Varietät vom Kara-Dagh, Route Samsun-Amasia, 600—700 m, 29. Mai 1889, Bornm. Nr. 939. Diese Aufsammlung zitiert Borbás gelegentlich der Beschreibung seiner Varietät. Eine genaue Untersuchung ergab nun, daß die Rassen *microcalyx* (1912) und *subisophyllus* (1890) identisch sind. Dies hat zur Folge, daß ersterer Name als der jüngere fallen muß. Es muß heißen *T. moesiacus* Vel. var. *subisophyllus* (Borb.) Ronn. (= *T. moesiacus* Vel. var. *microcalyx* [Deg. & Urum] Ronn. ap. Hay., Prodr. 2: 355) — Daß ich den *T. subisophyllus* früher unrichtig auffaßte, ist dadurch zu erklären, daß Borbás eine Pflanze, die Bornmüller am 4. Juni 1890 bei Siwas (Nr. 2617) sammelte, ebenfalls so bezeichnete. Diese gehört aber zu *T. sgarrosus* F. & M., also in die Nähe des *T. punctatus* Vis. (Ronniger).

T. punctatus Vis. var. **sipyleus** (Boiss.) Ronn. ap. Rech. fil. Beih. Bot. Centrbl. 49 B., 1936: 664. — E: Böyük-Dere auf Hügeln (leg. Th. Pichler, Hb. Kew); Konstantinopel (leg. Wiedemann, Hb. Univ. Wien). — Die Namenskombination *T. pumetatus* Vis. var. *subisophyllus* (Borb.) Ronn. ap. Hayek, Prodr. 2: 361 ist abzändern in *T. punctatus* Vis. var. *sipyleus* (Boiss.) Ronn.

T. Sintenisii Čel. — Azn. MBL 4: 142 (als *T. Aznavouri* Vel.). — E: Safra-Koj; Menekscheh-Deressi (beide Azn.).

T. thracicus Vel. var. **prusanus** Ronn., nov. var.

Folia supra pilis adpersa. Rami floriferi pilis brevibus patentibus dense obsiti, pilis longis flexuoso-patentibus minus numerosis immixtis. Pili longiores diametrum rami aequantes vel paulo superantes. (Prusa = antiker Name der Stadt Brussa).

A: Fuß des Bithynischen Olymp, sonniger Rasen bei Ak-Dschellan.

- Lycopus europaeus* L. — E: Dschendere, Wald von Belgrad. — A: Böyük-Gök-Su, Damm der Wasserleitung.
Mentha eriantha C. Koch. — E: San Stefano, ausgetrockneter Sumpf.
M. longifolia Huds. — A: Antigoni (W. 283).
M. Pulegium L. var. *villosa* Benth. — Beg. 221. — H. M. 188 (beide als var. *tomentosa* [Sm.]). — A: Prinkipo, trockene Hügel (Nemetz, Beg., H. M.).
M. rotundifolia L. — Azn. BSBF 44: 173. — E.

Globulariaceae.

- Globularia trichosantha* F. & M. — A: Pendik, sonnige Stellen.
G. Willkommii Nym. — Azn. MBL 4: 142. — E: Meneksche-Deressi (Azn.).

Plantaginaceae.

- Plantago argentea* Chaix. — A: Aidos-Dagh.
P. Bellardi All. — E: Schischli, sonnige Stellen.
P. coronopus L. — Azn. BSBF 44: 174 (var. *simplex* Boiss.); MBL 12: 177 (typ.); MBL 12: 178 (var. *commutata* [Guss.] Fiori & Paol.). — E: (Azn.); Schischli; Kütschük-Tschenkmedsche, Strand. — A: Kaisch-Dagh (Azn., var. *commutata*).
P. indica L. — Azn. BSBF 44: 174 (als *P. arenaria* W. K.). — E.
L. Lagopus L. — E: Kütschük-Tschenkmedsche; Floria — San Stefano (W 269). — A: Brussa, sonniges Fließufer.
P. Lagopus L. var. *maior* Boiss. — E: San Stefano.
P. lanceolata L. — Azn. MBL 12: 177. — E: Kütschük-Tschenkmedsche; Konstantinopel (leg. Forskåhl); Floria — San Stefano (W 270).
P. lanceolata L. var. *eriophylla* Decn. — Azn. MBL 12: 177. — H. M. 188 (als *P. eriophoraj*. — Degen 45: 68. — A: Feuerberg; Aidos-Dagh bei Jakadschik (Azn.); Prinkipo (H. M.). — Sympeliadien (Degen).
P. maior L. var. *intermedia* (Gilib.) Decn. — Azn. BSBF 44: 174 (als *minor* Boiss.) — A.
P. Psyllium L. — E: San Stefano (W 26).

Gentianaceae.

- Centaurium maritimum* (L.) Fritsch. — A: Dschamlidscha.
C. pulchellum (Sw.) Druce f. *albiflorum* (Boiss.) Hay. — Azn. MBL 4: 136 (als *Erythraea ramosissima* Pers. var. *albiflora* Boiss.) — E: Hügel bei Therapia. (Azn.).
C. spicatum (L.) Fritsch. — Azn. BSBF 46: 144 (als *Erythraea s.* Pers.). — E: San Stefano. — A: Kartal (beide Azn.).
C. umbellatum Gilib. ssp. *rumeicum* (Vel.) Ronn. — E: Böyük-Dere, Sommer-Palast; Schischli, trockene Hügel gegen Kiat-Hane.
Gentiana verna L. var. *aestiva* (Schm.) Hayek. — Azn. BSBF 44: 173 (als Art).
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. — E: Wald bei Böyük-Dere.
Macrocalyx filiformis (L.) Hoffmg. & Lk. — A: Dschamlidscha.

Apocynaceae.

Vinca maior L. — H. M. 189. — A: Prinkipo (H. M.)

Rhazia orientalis (Decne.) DC. — Azn. MBL 4: 136. — E: Meneksche-Deressi. — A: Okranli (beide Azn., Herb. norm. Nr. 4562).

Apocynum Venetum L. — E: San Stefano, Strand.

Nerium Oleander L. — Krause 2: 572.

Asclepiadaceae.

Periploca graeca L. — Krause 2: 572.

Cynanchum acutum L. — A: Riva, Düne.

C. fuscatum (Vis.) Lk. — A: Aidos-Dagh, Kartal; K.-Dscharmlidscha (W 123).

C. speciosum (Boiss. & Spr.) Nym. — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Ak-Dschellan.

Marsdenia erecta (L.) R. Br. — A: Jum-Burnu, Hügel gegen Riva.

Oleaceae.

Fraxinus Ornius L. — E: Konstantinopel (W 209).

F. Ornius L. var. *rotundifolia* (Lam.) Ten. — Krause 2: 568 (var. *rotundifolia* und var. *angustifolia* Ten.). — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.

F. oxycarpa Willd. var. *oxyphylla* (M. B.) Lingelsh. — Krause 2: 30 und 2: 569. — E: Wald von Belgrad (Krause).

Phillyrea latifolia L. — H. M. 189. — Krause 2: 570 (*P. latifolia* und *P. media* L.). — E: Dschendere. — A: Böyük-Gök-Su; Prinkipo (H. M.).

Olea europaea L. ssp. *Oleaster* (Hoffing & Lk.) Fiori. — Beg. 221 (als var.). — Prinkipo (Beg.).

Ligustrum vulgare L. — Krause 2: 571. — E: Belgrader Wald, bei den Bends.

Jasminum fruticans L. — Krause 2: 571. — A: Brussa, Weg zu den Bädern; Pendik; Antigoni (W 124).

Rubiaceae.

Sherardia arrensis L. — Azn. MBL 12: 166. (var. *maritima* Gris. mit f. *leiocalathia* Azn. und f. *hebecalathia* Azn.; var. *vulgaris* Azn. mit f. *transiens* Azn. — Bornm. 32 (var. *mutica* Wirtg.). — E: San Stefano; Kiat-Hane; Belgrader Wald (Bornm.). — A: Pendik.

S. arvensis L. ssp. *coriacea* Azn. — E: Konstantinopel (W 36); A: Antigoni (W 36); Prinkipo (Schwöder).

Crucianella angustifolia L. — Azn. BSBF 44: 171. — H. M. 189. A: (Azn.); Prinkipo (H. M.).

C. graeca Boiss. — Azn. BSBF 44: 171. — A.

C. imbricata Boiss. — Azn. BSBF 44: 171. — A.

C. latifolia L. — Azn. BSBF 44: 171. — A.

- Asperula aristata* L. ssp. *longiflora* (W. K.) Hay. — Azn. 3: 2 (als *A. flaccida* Ten.). — E: Yarim-Burgas (Azn.); San Stefano, Feldraine.
- A. arvensis* L. — Azn. BSBF 44: 171. E: (Azn.); Kütschük-Tschek-med sche (W 32). — A: (Azn.).
- A. involucrata* Berggr. ap. Wahlenbg. — Azn. MBL 12: 171. — Degen 41: 232. — E: Ufer des Bosporus (Degen). — A: Beikos, Laubwald; Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan; K. Dschamlidscha (W 31).
- A. littoralis* S. & S. — Degen 45: 68. — E: Kilia. — A: Riva (Degen).
- A. rivalis* S. & S. — Azn. BSBF 46: 143. — E: San Stefano, ausgetrockneter Sumpf (Nemetz, Azn.); Domusdere (Azn.).
- Galium Aparine* L. — A: Antigoni (W 200).
- G. constrictum* Chaub. — Azn. MBL 12: 171. — E: Belgrad-Köj (Azn.).
- G. divaricatum* Lam. — A: Dschamlidscha; Antigoni (W 199).
- G. coronatum* S. & S. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- G. cruciata* (L.) Scop. — E: Orta-Köj; Dschendere. — A: Aidos-Dagh, Kartal; Pascha-Bagtsche (W 35).
- G. firmum* Tsch. — Azn. BSBF 44: 171 (als *G. aureum* Vis.); BSBF 46: 143 (var. *scabrefolium* Boiss.). — A: Kartal (v. *scabrefolium*; Azn.).
- G. longifolium* (S. & S) Gris. — Azn. MBL 12: 171. — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan; Alem-Dagh (Azn., Nemetz.).
- G. mollugo* L. ssp. *erectum* (Huds.) Briq. — Azn. BSBF 46: 143 (als Art). — A: Zwischen Kartal und Soganlik (Azn.).
- G. murale* (L.) All. — E: Konstantinopel, auf einem Fensterbrett!
- G. palustre* L. — A: Antigoni (W. 198).
- G. palustre* L. ssp. *elongatum* (Presl) G. Beck. — Azn. BSBF 44: 171 (als Art). — E.
- G. pedemontanum* All. — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- G. spurium* L. var. *echinosperum* (Wallr.) Hay. — A: Pendik.
- G. tenuissimum* M. B. — A: Azn. BSBF 44: 171; MBL 3: 2. — Degen 45: 68. — H. M. 190. — A: Riva (Degen); Prinkipo (H. M.).
- G. tricorne* With. f. *luxurians* Beck. — Azn. MBL 3: 2. — E: Zekerie-Köj. — A: Tusla (beide Azn.); Antigoni (typ. — W 197).
- G. verum* L. var. *tuberculatum* Presl. — Azn. BSBF 44: 171. — Krause 2: 235 (typ.). — E: (Azn.); San Stefano, ausgetrockneter Sumpf; Orta-Köj. — A: (Azn.); Bulgurlu-Dagh bei Skutari (Krause); Antigoni (typ. — W 34).
- Valantia muralis* L. — Azn. MBL 3: 2. — E: Mündung des Seimen-Deressi (Azn.).
- Rubia peregrina* L. — E: Therapia. — A: Alem-Dagh; Beikos, Yosua-Dagh; Antigoni (W 33).
- R. tinctorum* L. — Krause 2: 236. — A: Halki (Krause).

Caprifoliaceae.

- Sambucus Ebulus* L. — A: Böyük-Gök-Su.
- S. nigra* L. — Azn. BSBF 44: 171. — Krause 2: 574. — E: (Azn.) Konstantinopel; Orta-Köj. — A: (Azn.); Bithynischer Olymp, 800 m.

Lonicera Caprifolium L. — E: Orta-Köj; Konstantinopel (W 28).

L. etrusca Santi — Azn. MBL 12: 165. — H. M. 190. — Krause 2: 236, 2: 576. — E: Therapia; Kalender (beide Azn.); Bosporus (Krause). — A: Wald bei Beikos; Prinkipo (H. M.).

Valerianaceae.

Valerianella carinata Lois. — Azn. BSBF 44: 171. — E: (Azn.); San Stefano (W 24, 287).

V. coronata DC. — A: Antigoni (W 23, 286).

V. dentata Pall. — Azn. BSBF 44: 171 (als *V. Morisonii* DC). — A.

V. echinata (L.) DC. — Azn. BSBF 44: 171. — E: (Azn.); San Stefano.

V. eriocarpa Desv. — Azn. BSBF 44: 171. — E.

V. microcarpa Lois. — E: Süße Wasser (W 289).

V. rimosa Bast. — Azn. BSBF 44: 171 (als *V. auriculata* DC). — A.

V. trunecata (Rchb.) Betcke. — Azn. BSBF 44: 171. — E: (Azn.). Schischli (W 288).

V. turgida (Stev.) Betcke. — Bornm. 32. — E: San Stefano, Bahn; Belgrader Wald (Bornm.).

V. vesicaria (L.) Mnch. — Azn. BSBF 44: 171. — E.

Kentranthus ruber (L.) DC. — Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.); Antigoni (W 27).

Dipsacaceae.

Dipsacus laciniatus L. — Azn. BSBF 44: 171. — E: (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche, Wassergraben.

Cephalaria syriaca (L.) Schrad. — Azn. BSBF 44: 171. — E.

Knautia byzantina Fritsch, VZBG 45: 429. — Azn. BSBF 44: 171. — E: Jedi-Kule.

K. Degeni Borbás — det. Szabó. — Azn. BSBF 44: 429. — E: (Azn.); Zekeric-Köj; Bagtsche-Köj., Feldraine; Rumeli-Fanar. — A: (Azn.); Aidos-Dagh bei Kartal; Bithynischer Olymp, bei Ak-Dschellan.

Scabiosa atropurpurea L. var. *maritima* (Torn.) Beg. — Beg. 222 (als Art). — E: Jedi-Kule, Feldraine. — A: Kandilli, altes Schloß; Prinkipo (Beg.).

S. canescens W. K. — Azn. BSBF 44: 1717 (als *S. suaveloens* Desf.). — A.

S. ochroleuca L. — A: Adam-Pol, Alem-Dagh.

S. ucranica L. — E: Kütschük-Tschekmedsche, am See.

Campanulaceae.

Campanula lyrata Lam. — Krause 2: 237. — E: Wald bei Dschendere.

— A: Brussa, Spitalberg; Wald bei Beikos; Bulgurlu-Dagh bei Skutari (Krause); Antigoni (W 38).

C. persicifolia L. — E: Belgrader Wald, lichter Laubwald; Wald bei Bagtsche-Köj. — A: Wald bei Beikos.

C. Rapunculus L. — E: Schischli; Orta-Köj.

- Legouxia pentagonia* (L.) Thell. — Krause 2: 237. — E: Zekerie-Köj; Orta-Köj; Jedi-Kule. — A: Brussa, sonniges Flußufer; Pendik, Felder; Bulgurlu-Dagh bei Skutari (Krause); Dschamlidscha (W 40); Antigoni (W 39).
- L. speculum Veneris* (L.) Fisch & Mey. — E: Schischli. — A: Tasch-Delen bei Armeni-Köj.
- Jasione¹⁾ Heldreichii* Boiss. & Orph. var. *microcephala* Vel. — A: Dünen-sand östlich Jum-Burnu.
- J. montana* L. var. *dentata* DC. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

Lobeliaceae.

- Laurentia Michelii* DC. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

Compositae.

- Eupatorium cannabinum* L. — Azn. BSBF 44: 171 (f. *simplicifolium* Hal., als var. *indivisum* Boiss.). — E: (Azn.). — A: Böyük-Gök-Su.
- Dichrocephala latifolia* (Lam.) DC. — Azn. BSBF 46: 143. — E: Zekerie-Köj (Azn.).
- Bellis annua* L. — E: Dschendere; Kiat-Hane; Kütschük-Tschek-medsche.
- B. perennis* L. — H. M. Ann. Nat. Mus. Wien 27, 1913: 431. — E: Kiat-Hane; Wald bei Bagtsche-Köj; San Stefano, Wiese; Schischli (W 293). — A: Bithynischer Olymp, über 1000 m; Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 293).
- B. silvestris* Cyr. — E: Orta-Köj, trockene Hügel.
- Aster Linosyris* (L.) Bernh. — A: Dschamlidscha.
- A. Tripolium* L. — E: San Stefano, sumpfiges Meeresufer.
- Erigeron canadensis* L. — Azn. MBL 3: 2. — E: Kalender; Belgrader Wald (beide Azn.).
- E. crispus* Pourr. — Azn. MBL 3: 2 (als *E. linifolius* Willd.). — A: Zwischen Pendik und Dolaiba (Azn.).
- Micropus bombycinus* Lag. — Azn. MBL 12: 171. — A: Pendik (Azn.).
- M. supinus* L. — A: Pendik.
- Evax pygmaea* (L.) Pers. — E: Schischli, sonnige Stellen. — Nach Hayek Prodr. 2: 590 neu für Thrazien.
- Filago gallica* L. — Konstantinopel (W 18). A: Antigoni (W 290).
- F. gallica* L. f. *tenuifolia* (Presl) Fiori. — Azn. MBL 3: 3 (als Art). — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane-Köj (Azn.).
- F. germanica* L. — E: Schischli; Rumeli-Fanar, trockene Wiese. — A: Böyük-Gök-Su, Teichufer; Antigoni (W. 14, 291).
- F. spathulata* Presl. — Azn. MBL 3: 2. — E: Makri-Köj. — A: Bo-standschik (beide Azn.).
- Inula ensifolia* L. — Azn. MBL 12: 171. — A: Yakadschik-Dagh; zwischen Alemdagh und Tschatal-Dagh (beide Azn.).
- I. graveolens* (L.) Desf. — E: Orta-Köj, trockene Wiese.

¹⁾ Vgl. O. Schmeja: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Jasione*. Beih. z. Bot. Centrbl. 48, II, 1931. — *J. Heldreichii* wird dort als Synonym zu *J. montana* L. gezogen.

- I. heterolepis* Boiss. — A: „Bithynia“ (W 4). — Wohl nicht aus der näheren Umgebung von Konstantinopel!
- I. hirta* L. — Azn. BSBF 44: 171. — A.
- I. Oculis Christi* L. — Krause 2: 239. — A: Halki (Krause).
- I. viscosa* Ait. — H. M. 193. — Beg. 222 (var. *angustifolia* Beg.). — A: Prinkipo, sonniges Meeresufer (Nemetz, H. M., Beg.).
- Pulicaria dysenterica* (L.) Gärtn. — Azn. MBL 12: 171 (var. *microcephala* Boiss.). — E: San Stefano, ausgetrockneter Sumpf. — Am Bosporus gemein (Azn.).
- P. odora* (L.) Rchb. — H. M. 193. — E: Schischli, trockene Hügel. — A: Dschamlidscha; Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 1). Nach Hayek Prodr. 2: 608 neu für Thrazien; wohl eine vorwiegend westmediterrane Art wie z. B. *Cytisus monspeliacus*.
- P. sricula* (L.) Moris. — Azn. BSBF 44: 171. — E.
- Carpesium cernuum* L. — Azn. BSBF 44: 171. — A.
- Pallensis spinosa* (L.) Cass. — Azn. BSBF 44: 171. — H. M. 193. — E: (Azn.); Schischli, trockene Hügel. — A: Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 2).
- Xanthium spinosum* L. — Azn. MBL 12: 171 (typ. und var. *longirostre* Azn.). — E: Kiat-Hane; zwischen Böyük-Dere und Bagtsche-Köj (Azn.); Hass-Köj (W 12).
- Anthemis aciphylla* Boiss. (var. *discoidea* Boiss.) — Azn. MBL 3: 3; BSBF 44: 171 (als *A. Rouyanica* Azn.). — A: Jakadschik und Aidos-Dagh bei Kartal (Azn.).
- A. altissima* L. — E: Jedi-Kule, Feldraine; Konstantinopel (W 7).
- A. chia* L. — E: Kiat-Hane. — A: Pendik.
- A. Cota* L. — E: Dschendere; Jedi-Kule.
- A. Cotula* L. — Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.).
- A. montana* L. — A: Aidos-Dagh; Bithynischer Olymp, Gebüsch bei 1000 m.
- A. orientalis* (L.) Deg. var. *tenuiloba* (DC.) Hay. — Bornm. 34 (als Art.). — E: Belgrader Wald (Bornm.).
- A. Sismondaeana* Clem. — A: Brussa, sonniges Flussufer.
- A. tinctoria* L. — Degen 45: 68 (var. ?). — E: Jedi-Kule, Stadtmauer. — A: Brussa, Spitalberg; Riva (Degen).
- A. tinctoria* L. var. *discoidea* (Willd.) Vahl. — E: Orta-Köj; Konstantinopel (W 6).
- A. tinctoria* L. var. *pallida* DC. — E: Orta-Köj; Therapia, Sommer-Palast.
- A. tomentosa* L. — Azn. BSBF 44: 172 (ssp. *peregrina* [L.] Hay., als Art.). — E: (Azn.); Kütschük-Tschenkmedsche. — A: (Azn.).
- Achillea crithmifolia* W. K. — Azn. MBL 3: 3. — E: Am Damm des Topuslu-Bend bei Bagtsche-Köj (Azn.).
- A. nobilis* L. var. *ochroleuca* Boiss. — Azn. MBL 12: 172. — E: Kiat-Hane-Köj (Azn.).
- A. setacea* W. K. — Azn. BSBF 44: 171. — E, A.
- Diotis maritima* (L.) Sm. — Degen 45: 68 (als *D. candidissima* Desf.). — E: Kütschük-Tschenkmedsche. — A: Dünensand östl. Jum-Burnu; Riva (Degen). — Floria (W. 15).
- Chrysanthemum coronarium* L. — Azn. BSBF 46: 144. — E: Kiat-Hane-Köj (Azn.).

- C. segetum* L. — E: Orta-Köj; Jedi-Kule; Okmaidan (W 292).
Leucanthemum vulgare Lam. — Azn. BSBF 44: 172. — A.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. — Azn. BSBF 46: 144
 (als *Chamaemelum inodorum* Vis.). — E: Kiat-Hane-Köj. (Azn.).
Artemisia Absinthium L. — Azn. BSBF 44: 172. — E.
A. annua L. — E: San Stefano, Bahndamm.
A. maritima L. — Azn BSBF 44: 172. — A.
Matricaria Chamomilla L. — E: Schischli. — A: Kali-Köj (W 11).
Doronicum caucasicum M. B. — Bornm. 33. — E: Wald bei Dschendere; Belgrader Wald (Bornm.); Böyük-Dere. — A: Kartal, niederes Gestrüpp; Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m; Aidos-Dagh; Kaisch-Dagh.
Senecio Castagneanus DC. — A: Dschamlidscha.
S. erraticus Bert. — E: San Stefano, ausgetrockneter Sumpf.
S. lividus L. — Azn. BSBF 44: 172. — A.
S. vernalis W. K. — Azn. BSBF 44: 172. — E: (Azn.); San Stefano; Bahndamm; Domusdere, Düne.
S. vulgaris L. — Konstantinopel, Wege, Mauern; San Stefano, Bahndamm; Kütschük-Tschechkmedsche.
Calendula arvensis L. — E: San Stefano, Bahndamm; Orta-Köj, Schutt-hügel. — A: Antigoni (W 294).
Echinops albidus Boiss & Spr. — Azn. BSBF 44: 172, MBL: 3: 4. — E: Meneksche-Deressi bei Jarim-Burgas (Azn.).
E. microcephalus L. — Degen 45: 68. — E: Schischli. — A: Östlich von Riva (Degen).
E. orientalis Trautv. — Azn. MBL 12: 172. — E: Süße Wasser von Europa; Gümüsch-Suju. — A: Haidar-Pascha (sämtl. Azn.).
E. Ritro L. var. *ruthenicus* (M. B.) Hay. — Azn. BSBF 44: 172 (als var. *tenuifolius* Boiss.). — E: (Azn.); San Stefano.
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. — E: Kütschük-Tschechkmedsche.
Xeranthemum annum L. — Azn. MBL 12: 172. — E: Süße Wasser von E. (Azn.).
X. foetidum (Cass.) Mnch. — Azn. MBL 12: 172 (als *X. cylindraceum* S. & S.); MBL 6: 10 (ssp. *giganteum* Azn.). — A: Zwischen Soganlik und Jakatschik; Pendik (beide Azn.).
Carlina corymbosa L. — Azn. MBL 12: 172. (var. *genuina* Boiss. und var. *graeca* Boiss.). — E: Therapia; Kalender (beide Azn.).
C. lanata L. — Azn. MBL 12: 172. — E: San Stefano (Azn.); Floria (Azn.); Kütschük-Tschechkmedsche. — A: Pendik (Azn.).
C. vulgaris L. ssp. *intermedia* (Schur) Hay. — Azn. MBL 3: 4 (als *C. brevibracteata* Andrae). — E: Zwischen Sariger und Zekeri-Köj (Azn.).
Jurinea kiliae Azn. — Azn. BSBF 44: 172. — E: Kilia, Düne (Nemetz, Azn.). — A: Riva (Azn.).
Carduus candicans W. K. ssp. *eu-candicans* Hay. — Azn. BSBF 44: 172 (als *C. collinus* W. K.). — A.
C. marmoratus Boiss. & Heldr. var. *Halacsyi* (Heldr.) Hal. — Azn. MBL 3: 4. — E: Pera (Azn.).
C. nutans L. s. l. — E: Konstantinopel (W 10).
C. pycnocephalus Jacq. — A: Brussa, sonniges Flussufer.

- Notobasis syriaca* (L.) Cass. — Degen 45: 68. — A: Riva (Degen). — E: Bosporus (W 9).
- Cirsium arvense* (L.) Scop. — Azn. BSBF 44: 172. — E, A.
- C. creticum* (Lam.) Urv. var. *Hippolyti* (Bory & Chaub.) Janch. — Azn. BSBF 44: 172, MBL 12: 173 (als var. von *C. siculum* DC.) — E, A.
- C. hypoleucum* DC. — Bornm. 33. — E: Belgrader Wald (Bornm.). — A: Tasch-Delen bei Armeni-Köj; Beikos, Wald; Fuß des Bi-thynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- C. italicum* (Savi) DC. — Azn. BSBF 44: 172. — E.
- C. polyccephalum* DC. — Azn. MBL 12: 172 (als *C. lappaceum* M. B. var. *microcephalum* Boiss.). — A: Beikos; Alem-Dagh; Skutari (sämtlich Azn.).
- Picnomon Acarna* (L.) Cass. Azn. 12: 173. — Beg. 222. (beide als *Cirsium Acarna*). — A: Prinkipo (Beg.).
- Silybum Marianum* (L.) Gärtn. — Beg. 222. — E: Jedi-Kule. — A: Brussa, sonniges Flußufer; Prinkipo (Beg.).
- Tyrimmus leucographus* (L.) Cass. — Degen 45: 68. — E: Orta-Köj. — Symplegiaden (Degen).
- Onopordon Acanthium* L. — Azn. MBL 12: 173. — E: Pankaldi. — A: Kadi-Köj (beide Azn.).
- Crupina crupinastrum* (Mor.) Vis. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.); Jedi-Kule. — A: (Azn.).
- C. vulgaris* Cass. — Azn. MBL 3: 4. — E: Jedi-Kule, Feldraine; zwischen Sarijer und Zekerie-Köj (Azn.). — A: Dschamlidscha; Aidos-Dagh bei Kartal; Kartal (Azn.).
- Centaurea*¹⁾ *calcitrapa* L. — Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.).
- C. cuneifolia* S. & S. ssp. *sublanata* (DC.) Hay. — Azn. MBL 12: 173 (als *C. sublanata* Boiss. — f. *albiflora* Azn.). — A: Riesenberg (Azn.).
- C. depressa* M. B. — Azn. MBL 3: 4. — E: Bei Yerli-Köj zwischen Sarijer und Kilia (Azn.).
- C. diffusa* Lam. — E: Kiat-Hane; San Stefano, gegen Tschekmedsche. — A: Kartal (Azn.).
- C. iberica* Trev. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.); San Stefano.
- C. kilaea* Boiss. — Degen 45: 68. — E: Kilia; Ufer des Bosporus (Degen).
- C. salonitana* Vis. — E: San Stefano.
- C. salonitana* Vis. var. *macracantha* (DC.) Boiss. & Heldr. — Azn. BSBF 46: 144. — E: Zwischen San Stefano und Floria (Azn.); San Stefano.
- C. solstitialis* L. — Azn. MBL 12: 173. — Verbr. — E: San Stefano, Bahndamm.
- C. spinosa* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.
- C. Stoebe* L. — Azn. MBL 12: 173 (als *C. maculosa* Lam. — f. *albiflora* Azn.).
- C. thracia* (Jka.) Hay. — BSBF 46: 144 (als *C. monacantha* Boiss.). — A: Tusla (Azn.).

¹⁾ Vergl. Stojanoff, Studien über die Centaureen Bulgariens. Sofia 1935.

- C. virgata* Lam. var. *squarrosa* Boiss. — Azn. BSBF 46: 144. — A: Tusla; Kartal (Azn.).
- Microlonchus salmanticus* (L.) DC. — Azn. BSBF 46: 144. — A: Tusla (Azn.).
- Carthamus dentatus* Vahl. — Azn. MBL 12: 173. — E: San Stefano. — A: Eren-Köj (beide Azn.).
- C. dentatus* Vahl var. *ambiguus* (Heldr.) Hay. — Azn. BSBF 44: 173 (als Art). — E, A.
- C. lanatus* L. — Azn. MBL 12: 173. — H. M. 189. — A: Prinkipo (H. M.). — Verbr. (Azn.).
- Cnicus benedictus* L. — Azn. BSBF 46: 144. — A: Zwischen Adam-Pol und Pascha-Bagtsche (Azn.).
- Scolymus grandiflorus* Desf. — Azn. MBL 3: 5. — E: Makri-Köj (Azn.).
- S. hispanicus* L. Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.).
- S. maculatus* L. — E: Jedi-Kule.
- Catananche lutea* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.
- Cichorium Intybus* L. — Beg. 222. — E: Orta-Köj. — A: Prinkipo (Beg.).
- C. Intybus* L. var. *glabratum* (Presl) Gren. & Godr. — Azn. MBL 3: 5 (als Art). — E: Böyük-Dere (Azn.).
- C. pumilum* Jacq. — Azn. MBL 3: 5. — E: Zwischen Jedi-Kule und Bagtsche-Köj (Azn.).
- Lapsana communis* L. var. *glandulosa* Freyn. — Azn. MBL 3: 5. — A: Husseinli am linken Ufer der Riva (Azn.).
- L. communis* L. ssp. *intermedia* (M. B.) Hay. — E: Therapia, Sommer-Palast. — A: Dschamlidscha.
- L. pisidica* Boiss. & Heldr. — Azn. MBL 3: 5. — Bornm. 33 (beide als *L. peduncularis* Boiss). — E: Dschendere (Azn.); Therapia (Azn.); Belgrader Wald (Bornm.). — A: Berge hinter Skutari (Azn.).
- Tolpis umbellata* Bert. — A: Antigoni (W. 3).
- T. umbellata* Bert. var. *intermedia* Azn. — Azn. MBL 3: 6. — A: Hügel bei Dolaiba (Azn.).
- T. virgata* (Desf.) Bert. — E: Rumeli-Fanar. — Ist bei Hayek, Prodr. 2: 804 für Thrazien nicht angegeben.
- Zaxintha rerrucosa* Gaertn. — Azn. MBL 3: 7. — E: Flamur; Kalender, Sultan-Suju; Kiat-Hane-Köj (var. *glandulifera* Azn.). — A: Kurd-Köj (var. *glandulifera* Azn.). — (Sämtlich Azn.).
- Rhagadiolus stellatus* (L.) Willd. — Azn. BSBF 46: 144 (var. *leiolaenus* Boiss. und var. *hebelaenus* DC). — E: Kütschük-Tschekmedsche; Galataria-Jedi-Kule (Azn.). — A: Pendik (Azn.); K.-Tschekmedsche (W 275).
- R. stellatus* (L.) Willd. var. *edulis* (Gärtn.) DC. — E: Kütschük-Tschekmedsche; Böyük-Dere; Belgrader Wald. — A: Kartal.
- Hedypnois rhagadioloides* (L.) Willd. ssp. *cretica* (L.) Hay. — Azn. MBL 3: 5 (als *H. polymorpha* DC. var. *cretica* W.). — H. M. 199 (als Art). — E: Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; Halkali (Azn.); San Stefano (Azn.). — A: Kadi-Köj (Azn.); Skutari (Azn.); Prinkipo (H. M.).

- H. rhagadioloides* (L.) Willd. ssp. *monspeliensis* (Willd.) Hay. — Azn. MBL 3: 5 (als *H. polymorpha* var. *monspeliensis* W.) — E: San Stefano. — A: Prinkipo (beide Azn.).
- H. rhagadioloides* (L.) Willd. ssp. *tubaeformis* (Ten.) Hay. — Azn. MBL 3: 5 (als *H. polym.* var. *rhagadioloides* W. und var. *tubaeformis* Ten.). — E: Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; Meneksche-Deressi (Azn.); Flamur (Azn.). — A: Pendik; Aidos-Dagh.
- Hypochoeris glabra* L. — Azn. BSBF 44: 173. — E, A.
- H. radicata* L. — E: Therapia, Sommer-Palast; Rumeli-Fanar. — A: Alem-Dagh,
- Leontodon crispus* Vill. ssp. *asper* (W. K.) Rohl. — Azn. MBL 3: 6 (als *L. asper* Poir.). — E: Meneksche-Deressi zwischen Halkali und Jarim-Burgas (Azn.).
- L. tuberosus* L. — Azn. MBL 3: 6 (var. *Olivieri* (DC.) Hay. — als var. von *Thrinacia tuberosa* DC.). — E: Böyük-Dere; Therapia (Nemetz, Azn.); Halkali (Azn.). — A: Prinkipo (Azn.).
- Pieris echiodoides* L. — Azn. MBL 3: 7. — Beg. 223 (beide als *Helminthia e.* Gaertn.) — E: Rumeli-Fanar, Bachufer (Nemetz, Azn.); Floria (Azn.); Böyük-Dere (Azn.). — A: Prinkipo (Beg.).
- Urospermum picroides* (L.) Desf. — Azn. BSBF 44: 173. — H. M. 199. — E: (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche. — A: Prinkipo. (H. M.): Kartal, Bahndamm.
- Scorzonera mollis* M. B. — A: Antigoni (W 8).
- Tragopogon dubius* Scop. — Azn. BSBF 44: 173 (als *T. major* Jacq.) — E, A.
- T. hybridus* L. — Azn. BSBF 44: 173 (als *Geropogon glaber* L.) — E. A.
- Podospermum canum* C. A. Mey. — Bornm. 32 (als *P. Jacquinum* Koch). — E: Domus-Dere; Therapia; Belgrader Wald (Bornm.). — A: Kaisch-Dagh; Kartal, Bahndamm.
- Rodigia commutata* Spr. — Azn. BSBF 44: 173. — E: (Azn.). — A: Brussa, sonniges Flußufer.
- Lagosseris sancta* (L.) K. Maly ssp. *bifida* (Vis.) Thell. — E: Orta-Köj; San Stefano, Bahndamm: Schischli; Kiat-Hane; Böyük-Dere; Bagtsche-Köj; Kütschük-Tschekmedsche. — A: Dschamlidscha; Kütschük-Gök-Su bei Anatol-Hissar.
- Chondrilla juncea* L. — Azn. MBL 12: 174 (var. *spinulosa* Koch). — Beg. 223 (var. *angustifolia* Doell). — E: Kiat-Hane; zwischen Sarijer und Kilia (Azn.) — A: Pendik (Azn.); Prinkipo (Beg.).
- Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. — det. Handel-Mazzetti. — A: Bithynischer Olymp.
- T. megalorrhizon* (Forsk.) H. M. — Beg. 222. — A: Prinkipo (Beg.).
- T. obliquum* Fries. — det. Handel-Mazetti. — E: Waldrand bei Böyük-Dere.
- Reichardia picroides* (L.) Roth — Degen 45: 67 (als *Picridium picroides* Karst.) — E: Kiat-Hane; Rumeli-Fanar, Felsen am Meer. — Symplegiaden (Degen).
- Sonchus glaucescens* Jord. — E: Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; Zekerie-Köj.

S. oleraceus (L.) Gou. — Beg. 223. — A: Prinkipo (Beg.); Antigoni (W 394).

S. tenerinus L. — Azn. BSBF 44: 173. — Degen 45: 68, — E, A. (Azn.). — Symplegiaden (Degen).

Lactuca cretica Desf. — Azn. BSBF 44: 173. — A.

L. Serriola L. — Azn. MBL 12: 174 (als *L. scariola* L. typ. und f. *integrifolia* Bogenh.) — A: Kurbal-Dere (Azn.).

Crepis Murmanni Boiss. — Azn. MBL 3: 8. — E: Flamur; Jeni-Köj (beide Azn.).

Crepis Nemetzii Rech. fil., sp. n.

Perennis ?. Caulis simplex, erectus, monocephalus, subtiliter sulcatus, valde glabrescens, 4—6 foliatus. Folia rosularia ad 10 cm longa, ad 2.5 cm lata, ambitu obovato-oblonga, apice rotundata, basi in petiolum lamina dimidio circiter breviorem sensim attenuata, runcinato-ovovata lobis obtusiusculis, minute et remote cartilagineo-mucronulatis, consistentia in sicco papyracea (an in vivo carnosa ?) supra et subtus pilis sparsis 0.3—0.7 mm longis in sicco flavescentibus obsita. Folia caulinis sensim decrescentia, infima acuta runcinato-lobata, media subintegra apicem versus sensim angustata, summa integerrima, linear-lanceoleta, acutissima, subsquamiformia. Capitulum floribus inclusis ca. 4 cm diametro. Involucrum 15 mm longum eglandulosum 2 — (vel indistincte 3 —) seriatum, imbricatum; squamae exteriores ca. 10 mm longae acutissimae, e basi ca. 2 mm lata sensim agustatae, olivaceae, anguste membranaceo-marginatae, dorso villis flavescentibus saepe ultra 1 mm longis obsitae. Squamae interiores ad 15 mm longae, latiores, pallidiores, in medio dorso densius villosi, preterea utrinque pube minutissima nitidula obsitae. Ligulae in sicco sordide flavescentes. Achaenia (immatura) 2—3 mm longa, atro-brunnea, erostrata, non alata, obsolete sulcata. Pappus niveus + 12 mm longus.

Kilia, Dünen, blühend am 9. Mai 1896.

Unterirdische Teile und reife Früchte fehlen, daher bleibt die systematische Stellung der Art vorläufig zweifelhaft. Es dürfte sich jedoch um eine Art mit Rhizom handeln. Habituell ist die Pflanze am ehesten mit einköpfigen, kräftigen Individuen von *Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch zu vergleichen. Die Blattform erinnert etwas an *Crepis Fraasii* Schultz, nur daß der Endlappen viel weniger vergrößert ist als bei dieser. — Prof. Bornmüller teilt meine Ansicht, daß hier eine neue Art vorliegt.

C. parviflora Desf. — Azn. BSBF 44: 173. — A:

C. pulchra L. — Azn. BSBF 44: 173. — E.

C. Reuteriana Boiss. — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Gebüsch bei Ak-Dschellan.

C. setosa Hall. — Azn. MBL 12: 174 (als *C. virens* L.). — E: Böyük-Dere (Azn.).

C. vesicaria L. var. *scariosa* (Willd.) Vis. — E: Domus-Dere.

- Hieracium¹⁾ Hoppeanum* Schultz bip. ssp. *macrolepioides* Zahn. — A: Alem-Dagh.
H. latifolium Spr. ssp. *Noeatum* Zahn. — E: Belgrader Wald, lichter Laubwald.
H. umbellatum L. ssp. *eu-umbellatum* Zahn var. *trachyphyllos* Zahn.
— A: Adam-Pol.

Alismataceae.

- Alisma Plantago* L. var. *lanceolatum* Koch und var. *latifolium* Gren.
— Azn. MBL 5: 167. — E: Böyük-Dere (Azn.).

Potamogetonaceae.

- Potamogeton densus* L. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
P. fluitans Roth. — E: Rumeli-Fanar-Dere.
P. gramineus L. var. *heterophyllus* Fr. — Azn. BSBF. 44: 174 (als *heterophyllus* „Schreb.“).
P. pusillus L. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
Ruppia maritima L. ssp. *rostellata* (Koch) Aschers. — Azn. BSBF 46: 148 (als Art). — A: Pendik (Azn.).
Zostera marina L. — E: Moda.

Najadaceae.

- Najas minor* All. — Azn. MBL. 5: 167. — E: Zwischen Kiat-Hane-Köj und Dschendere.

Liliaceae.

- Colchicum chalcedonicum* A zn. BSBF 44: 174. — Vergl. Stefanoff Monographie der Gattung *Colchicum* L. Sbornik. na Blg. Akadem. Nauk. 22: (1926). — A: Berge hinter Kadi-Köj (Azn.); Aidos-Dagh; Kartal; Dschamlidscha.
C. miranthum Boiss. — Azn. MBL 5: 168. — E: Berg Kodscha-Tasch bei Böyük-Dere; Belgrader Wald. — A: Karli-Dagh (sämtl. Azn.).
C. turcicum Janka. — E: Dschendere, Talwiesen. — A: Haidar-Pascha, Wiesen; Dschamlidscha; Kadi-Köj.
Asphodelus fistulosus L. — A: Kartal, Bahndamm; Antigoni (W. 108).
A. messeniacus Heldr. — Azn. MBL 10: 12. — A: Tasch-Köprü bei Pendik (Azn.).
A. microcarpus Salzm. — A: Kaisch-Dagh; Kartal, Bahndamm. — ? Pitta (W 101).
Gagea amblyopetala Boiss. & Heldr. — E: Orta-Köj; Schischli. — A: Dschamlidscha; Bithynischer Olymp, 2200 m.
Allium ampeloprasum L. — Azn. BSBF 44: 175. — E.
A. atropurpureum W. K. — A: Tusla.
A. Cyrillici Ten. — Azn. BSBF 44: 176. — A.

¹⁾ Gattung *Hieracium* bestimmt von H. Zahn, Haigerloch (Hohenzollern).

- A. decipiens* Fisch. — Azn. BSBF 46: 150. — „Byzantium“ (Richter, Pl. Europ. I, p. 210).
- A. fistulosum* L. — Degen ÖBZ 45: 68. — E: Ufer des Bosporus (Degen).
- A. margaritaceum* S. & S. — Azn. 10: 10. — E: Schischli; Domus-Dere (Azn. — var. *guttatum* Gay. mit f. *chlorostictum* Azn.). — A: Jakadschik-Dagh (Azn. var. *guttatum*); Adinlital (Azn. var. *affine* Reg.).
- A. myrianthum* Boiss. — Azn. BSBF 46: 149. — E: San Stefano, sumpfige Stellen. (Azn.).
- A. Neapolitanum* Cyr. — A: Josua-Dagh bei Beikos.
- A. paniculatum* L. — Azn. MBL 12: 180. — A: Anadolu-Koraghi (Azn.).
- A. Peroniianum* Azn. — Azn. BSBF 44: 175. — A: Berge hinter Maltepe (Azn.).
- A. roseum* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E: (Azn.). — A: (Azn. — var. *bulbiferum* Boiss.).
- A. spherocephalum* L. — Azn. MBL 12: 179. — Degen 45: 68. — A: Pendik (Azn.). — Symplegiaden (Degen).
- A. stamineum* Boiss. — Azn. MBL 10: 11. — E: Halkali (Azn.). — A: Kaisch-Dagh (Azn. — var. *hymettium* Boiss.).
- A. staticiforme* S. & S. ssp. *Weissii* (Boiss.) Hay. — Azn. BSBF 46: 149 (als Art). — E: Zwischen Kütschük-Tscheckmedsche und San Stefano (Azn.).
- A. vineale* L. var. *compactum* (Thuill.) Vis. — Azn. BSBF 44: 175 (als Art). A.
- Lilium Martagon* L. — A: Adam-Pol.
- Fritillaria pontica* Wahlenbg. — Bornm. 33. — E: Böyük-Dere, große Wiese; Belgrader Wald (Bornm.). — A: Bithynischer Olymp, Wiese bei 1000 m.
- Tulipa hellespontica* Degen MBL 32: 146. — E: Dermen-Köj bei Čataldja (Urumov).
- Scilla autumnalis* L. — Beg. 221. — A: Dschamlidscha; Prinkipo (Beg.).
- S. bifolia* L. — E: Wald bei Dschendere.
- S. bifolia* L. var. *nivalis* (Boiss.) Baker. — A: Bithynischer Olymp, über 2000 m.
- Ornithogalum byzantinum* Azn. — Azn. BSBF 46: 149. — E: Kiat-Hane, große Wiese; Tal von Ali-Bey-Köj nach Kiat-Hane (Azn.).
- O. comosum* L. — Azn. BSBF 44: 175. — A: (Azn.); Dschamlidscha.
- O. fimbriatum* Willd. — Azn. BSBF 46: 149 (typ. und var. *ciliatum* Boissieu). — Krause 1: 823. — E: Konstantinopel (W 102, 319). — A: Kaisch-Dagh, grasiger Gipfel; Kartal (Azn.); Antigoni (Krause).
- O. montanum* Cyr. — E: Kütschük-Tscheckmedsche, Bahndamm. — A: Kaisch-Dagh (Zwiebeln, kult. Bot. Garten, Wien).
- O. nanum* S. & S. — E: Orta-Köj, Wiese; San Stefano. — A: Dschamlidscha.
- O. narbonense* L. — E: Balukli, im Getreide; Belgrader Wald bei Bagdsche-Köj. — A: Tasch-Delen bei Armeni-Köj.
- O. nutans* L. var. *prasandrum* (Gris.) Baker. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m, Laubholz.

- O. oligophyllum* Clarke. — Azn. BSBF 46: 149. — Bornm. 33. — E: Zekerie-Köj (Azn.); Belgrader Wald (Bornm.). — A: Bithynischer Olymp, über 2000 m.
- O. sphaerocarpum* A. Kern. — A: Antigoni (W 99).
- O. refractum* Kit. — Azn. BSBF 46: 148. — Krause 1: 823. — E: Konstantinopel (W 318). — A: Pendik (Azn.); Josua-Dagh (Krause).
- O. umbellatum* L. — E: Konstantinopel (W 320). — A: Pendik, an der anatolischen Bahn.
- O. Wiedemannii* Boiss. — Azn. BSBF 46: 149. — E: Wald bei Dschendere; Wald bei Bagtsche-Köj; Böyük-Dere (Nemetz, Azn.).
- Bellevallia ciliata* (Cyr.) Nees. — Azn. BSBF 46: 150. — A: Tusla, Felder (Nemetz, Azn.).
- B. macrobotrys* Boiss. — Azn. BSBF 46: 150. — A: Tusla (Azn.).
- B. trifoliata* (Ten.) Kunth. — Azn. BSBF 46: 150. — E: Kilia; Domus-Dere; Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm; Skumru-Köj (Azn.).
- Muscari comosum* Mill. — Azn. et Wimmer, Mpt. — E: Kilia, Felder; Domus-Dere; Bosporus (Azn.) — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan; Kartal (Azn.); Antigoni (W 317).
- M. Pinardi* Boiss. — Azn. MBL 10: 11. — A: Zwischen Pendik und Tusla; bei Yakadschik (beide Azn.).
- M. pulchellum* Heldr. & Sart. — Krause 1: 823. — A: Ins. Antigoni (Krause).
- M. racemosum* (L.) Mill. — Azn. MBL 10: 11 (var *neglectum* [Guss.] Brand, als Art). — E: Kiat-Hane; San Stefano (Nemetz, W 100); Skumru-Köj beim Ovid-Turm (Azn.). — A: Bithynischer Olymp, 2200 m.
- M. tenuiflorum* Tsch. — Azn. BSBF 44: 176. — E: Dschendere. — A: (Azn.); Tusla, Felder. — Bei Hayek Prodr. 3: 87 für Thrazien nicht angegeben.
- Asparagus acutifolius* L. — Beg. 220. — H. M. 202. — A: Prinkipo (Beg., H. M.).
- A. aphyllus* L. — A: Pendik.
- Ruscus aculeatus* L. — Bornm. 31. — Krause 1: 824. — E: Schischli; Rumeli-Fanar, Friedhof; Belgrader Wald (Bornm.). — A: Josua-Dagh (Krause).
- Danae racemosa* (L.) Mnch. — Azn. BSBF 46: 150. — Krause 2: 230. — E: Böyük-Dere. (Azn.). — A: Ufer des Bosporus (Krause).
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. — A: Bithynischer Olymp, Laubwald bei 1000 m.
- Smilax excelsa* L. — Azn. MBL 12: 180. — Bornm. 31. — Krause 2: 231. — E: Belgrader Wald (Nemetz, Bornm., Krause). — A: Beikos, Wald.

Amaryllidaceae.

- Leucoium aestivum* L. — E: San Stefano.
- Galanthus nivalis* L. — A: Beikos.
- G. plicatus* M. B. var. *byzantinus* (Baker) Beck. — Azn. MBL 12: 179. — A: Adam-Pol (Azn.).
- Sternbergia colchiciflora* W. K. — A: (Azn.); Dschamlidscha.

Pancratium maritimum L. — Degen 45: 68. — A: Riva (Degen).

Iridaceae.

- Crocus aerius* Herb. var. *pulchricolor* Herb. — A: Bithynischer Olymp, über 2000 m.
- C. biflorus* Mill. — Azn. BSBF 44: 174. — A: (Azn.); Dschamlidscha.
- C. biflorus* Mill. var. *Pestalozae* Maw. — Krause 1: 824. — E: Maslak (Maw nach Krause); Sinegli — Maslak (Dingler nach Krause). — A: Kaisch-Dagh (Krause); Dschamlidscha.
- C. cancellatus* Herb. — Azn. BSBF 44: 174. — A: (Azn.); Pendik.
- C. gargaricus* Herb. — A: Bithynischer Olymp, 2. Plateau, über 2000 m.
- C. Olivieri* Gay. — Azn. MBL 12: 179. — E: Zwischen Domus-Dere und Kara-Burnu (Azn.).
- C. pulchellus* Herb. — E: Kiat-Hane; Belgrader Wald, Gebüsch im Laubwald; bei Pyrgos. — A: Adam-Pol.
- Romulea Columnae* Seb. & Mauri. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.) Rumeli-Hissar. — A: Pendik,
- R. Linaresii* Parl. — Krause 1: 825 (var. *Sintenisii* Beg.). — E: Rumeli-Hissar. — A: Kaisch-Dagh, grasiger Gipfel; Ins. Antigoni (Krause).
- R. ramiiflora* Ten. — Azn. MBL 12: 179. — E: Floria (Azn.).
- Iris Pseudacorus* L. — E: Sumpf bei San Stefano. — A: Ak-Baba bei Beikos, an der Straße.
- I. pumila* L. — Krause 1: 825. — A: Kaisch-Dagh (Krause).
- I. rubromarginata* Baker. — Azn. MBL 5: 167 (var. *flavescens* Azn. und var. *violacea* Azn.). — E: Kiat-Hane (Nemetz, Azn.); Dschendere (f. *bicolor*); — A: Aidos-Dagh (typ. und f. *violacea* Azn.); Kaisch-Dagh (f. *violacea*); von Skutari bis Dodurlu (Azn.).
- I. Sintenisii* Janka. — Krause 1: 825. — Degen 41: 232. — E: Sonnige Hügel nördl. von Dschendere; Ufer des Bosporus (Degen). — A: Dschamlidscha; Alem-Dagh (Nemetz, Krause).
- Gladiolus segetum* Gawl. — Azn. MBL 5: 168. — E: Jedi-Kule, unter der Saat; zwischen Floria und Jedi-Kule (Azn.).

Dioscoreaceae.

- Tamus communis* L. — Azn. BSBF 44: 176. — H. M. 203. — E: Azn. — typ.). — A: Azn. — var. *cretica* Boiss.); Brussa, Weg zu den Bädern; Tusla; Fuß des Bithynischen Olymp bei Ak-Dschellan; Prinkipo (H. M.).

Juncaceae.

- Juncus acutus* L. — Azn. MBL 12: 180. — E: Domus-Dere (Azn.); Kütschük-Tscheckmedsche, Düne (Nemetz, Azn.).
- J. articulatus* L. — Azn. MBL 12: 180. — E: Zwischen Rumeli-Kavaki und Fener. — A: Zwischen Maltepe und Kartal (beide Azn.).
- J. atratus* Krock. — Azn. MBL 10: 12. — E: Zwischen Rumeli-Kavaki und Feneri (Azn.).

- J. bufonius* L. — Azn. MBL 12: 180. — E: Sultan-Mahmud-Bendi, Bagtsche-Köj (Azn.). — A: Dschamlidscha; Aidos-Dagh.
- J. bufonius* L. var. *fasciculatus* (Bert.) Koch. — Azn. BSBF 44: 176 (als Art). — E, A.
- J. compressus* Jacq. — Azn. MBL 10: 12. — E: Halkali (Azn.).
- J. subnodulosus* Schrk. — Azn. BSBF 46: 150 (als *J. obtusiflorus* Ehrh.). — A: Tusla (Azn.).
- J. maritimus* Lam. — A: Anatol-Hissar.
- J. subulatus* Forsk. — Azn. BSBF 46: 150. — A: Kartal (Azn.).
- J. Tenageia* Ehrh. — Azn. MBL 10: 12. — E: Zwischen Rumeli-Feneri und R.-Kavaki. — A: Zwischen Alein-Dagh und Tschatal-Dagh (beide Azn.).
- Luxula campestris* (L.) Lam. & DC. — E: Böyük-Dere; Wald bei Bagtsche-Köj. — A: Kaisch-Dagh, grasige Höhe; Bithynischer Olymp, 1000 m.
- L. campestris* (L.) Lam. & DC. ssp. *multiflora* (Ehrh.) A. & Gr. — Azn. MBL 10: 12 (als Art). — E: Kiat-Hane-Köj; Zekerie-Köj; Kilia. — A: Ins. Antigoni (sämtl. Azn.).
- L. Forsteri* (Sm.) DC. — Krause 1: 821. — E: Wald bei Dschendere; Belgrader Wald; Wald bei Bagtsche-Köj; Böyük-Dere; Rumeli-Hissar, Friedhof. — Kütschük-Gök-Su bei Anatoli-Hissar; Kaisch-Dagh, grasige Höhe; Josua-Dagh (Krause).

Cyperaceae.

- Pycreus esculentus* (L.) Hay. — Azn. MBL 10: 12 (als *Cyperus e.* L. var. *aureus* [Ten.] Richter). — ? Tschinar-Suju, Tschiftlik Vitalis Pascha (Azn.).
- P. longus* (L.) Hay. — E: Rumeli-Fanar, Bachufer; Yakadschik (W 188).
- P. rotundus* (L.) Hay. — Azn. BSBF 44: 176 (als *Cyperus r.* L.). — A.
- Galilea mucronata* (L.) Parl. — Azn. BSBF 44: 176 (als *Cyperus schoenoides* Gris.). — Degen 45: 68 (als *Schoenus mucronatus* L.). — E: (Azn.); Kütschük-Tschekmedsche, Düne. — A: (Azn.); Riva (Degen).
- Schoenoplectus cernuus* (Vahl) Hay. — Azn. BSBF 46: 150 (als *Scirpus Sarii* Seb. & Mauri). — A: Gipfel des Alem-Dagh (Azn.).
- S. lacuster* (L.) Palla. — Azn. MBL 12: 180 (als *Scirpus l.* L. — var. *digynus* Godr.) — E: Zwischen San Stefano und Makri-Köj; — A: Zwischen Maltepe und Kartal (sämtl. Azn.).
- S. supinus* (L.) Palla. — Azn. BSBF 44: 176 (als *Scirpus s.* L.). — A.
- Holoschoenus vulgaris* Lk. ssp. *eu-vulgaris* Hay. — Azn. MBL 12: 180 (als *Scirpus Holoschoenus* L.). — E: Zwischen Skumru-Köj und Domus-Dere; zwischen Schischli und Kiat-Hane (var. *australis* [L.] Hay.) — (Beide Azn.). — A: Antigoni (W 187).
- Eleocharis acicularis* (L.) R. Br. — Azn. BSBF 44: 176. — E.
- E. palustris* (L.) R. Br. — Azn. MBL 12: 181. — E: Belgradköj; zwischen Jedi-Kule und Makri-Köj (beide Azn.).
- Schoenus nigricans* L. — Azn. MBL 10: 12. — E: Meneksche (Azn.).
- Cladium mariscus* R. Br. — Azn. BSBF 46: 150. — A: Tusla (Azn.).
- Carex arenaria* L. — Azn. MBL 10: 12. — E: Kilia (Azn.).
- C. colchica* Gay. — Azn. BSBF 44: 176 (als *C. ligerica* Gay). — E.
- C. contigua* Hoppe. — Azn. BSBF 44: 176 (als *C. muricata* L.). — E.

- C. depressa* Lk. var. *transsilvanica* (Schur) Christ. — Azn. MBL 10: 12 (als *C. basilaris* Jord.); BSBF 46: 150. — E: Belgrad-Köj; Zwischen Skumru-Köj und Domus-Dere (beide Azn.).
- C. distans* L. — Azn. BSBF 46: 176. — E.
- C. divisa* Huds. — Azn. BSBF 44: 176; MBL 10: 12 (var. *rivularis* Kück.). — E: Schischli; Kilia, Düne; Zwischen Ejub und Silihdar-Aga (Azn. — var. *rivularis*). — A: (Azn.).
- C. extensa* Good. — Azn. BSBF 46: 150. — A: Maltepe (Azn.).
- C. flacca* Schreb. — E: Konstantinopel (W 190, 191, 192).
- C. flacca* Schreb. var. *cuspidata* (Host) Asch. et Gr. — Azn. MBL 10: 13. — H. M. 205 (als *C. flacca* Schreb. f. *cuspidata* [Host]). — E: Therapia; Wald bei Dschendere; Wald bei Bagtsche-Köj; Rumeli-Hissar, Friedhof; Zekerie-Köj (Azn.). — A: Prinkipo (H. M.); Antigoni (W. 193).
- C. flacea* Schreb. var. *cuspidata* (Host) Aschers & Gruber f. **Neometziana** FRITSCH in sched. Utriculi latiores, obtusi, glumis longiores. — Weibl. Achren sitzend, starr aufrecht, an der Spitze des Stengels zusammengedrängt, Tragblätter laubartig, die Blütenstiele überragend. — E: Belgrader Wald.
- C. flacca* Schreb var. *erythrostachys* Schur. — Azn. MBL 10: 13. — E: Zekerie-Köj (Azn.).
- C. hirta* L. — A: K. Dschamlidscha (W 189).
- C. leporina* L. — Azn. MBL 10: 12. — A: Karli-Dagh bei Beikos (Azn.).
- C. pendula* Huds. — Azn. MBL 10: 13. — E: Belgrader Wald; Böyük-Dere (Azn.). — A: Akbaba (Azn.).
- C. remota* L. — E: Belgrader Wald; Wald bei Bagtsche-Köj. — A: Kutschük-Gök-Su bei Anatol-Hissar.
- C. riparia* Curt. — E: Sumpf bei San Stefano.
- C. silvatica* Huds. — E: Rumeli-Hissar, türkischer Friedhof; Wald bei Dschendere; Wald bei Bagtsche-Köj.
- C. tomentosa* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E.
- C. verna* Chaix in Vill. — A: Kaisch-Dagh, grasige Höhe.
- C. vulpina* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E: San Stefano, Sumpf. — A: (Azn.).

Gramineae.

- Bromus arvensis* L. — Azn. MBL 10: 18. — E: Kalfa-Köj; San Stefano; Kilia (var. *sericostachys* Hal. und typ.). — A: Pendik. (Sämtl. Azn.).
- B. fasciculatus* Presl. — Azn. MBL 10: 18. — A: Zwischen Pendik und Jakadschik (Azn.).
- B. japonicus* Thunbg. — Azn. MBL 10: 19 — E, A: (Typ.). — E: Jedi-Kule; Makri-Köj (beide Azn. — var. *velutinus* Asch. & Gr.).
- B. macrostachys* Desf. — Azn. MBL 12: 184. — A: Jakadschik; Prinkipo (beide Azn. — var. *divaricatus* [Arcang.]).
- B. madritensis* L. — A: Antigoni (W 175).
- B. madritensis* L. var. *ciliatus* Guss. — Azn. MBL 10: 18. — A: Halki (Azn.).

- B. mollis* L. — E: Kiat-Hane, große Wiese; Kütschük-Tschechkmedsche, Bahndamm. — A: Kenan-Tepe (Feuerberg); Antigoni (W 182).
- B. ramosus* Huds. — Azn. MBL 10: 17. — E: Zekerie-Köj (Azn.).
- B. secoparius* L. var. *psilotachys* Hal. — Azn. MBL 10: 18. — E: San Stefano. — A: Jakadschik (beide Azn.).
- B. squarrosum* L. — Azn. MBL 10: 18. — E: Kiat-Hane-Suju (Azn.).
- B. squarrosus* L. var. *villosum* (Gmel.) Koch. A: Antigoni (W 174).
- B. tectorum* L. — Azn. MBL 10: 18 (typ., var. *ponticus* A. & Gr., var. *australis* Gr. & Godr.). — E: Kütschük-Tschechkmedsche, Düne; Silidar-Aga (Azn.). — A: Brussa, sonniges Flußufer; Halki (Azn. — var. *australis*).
- B. villosus* Forsk. var. *Gussonei* Parl. — Azn. MBL 10: 18. — E: Domusdere, Düne; Schischli (Azn.); Therapia (Azn.).
- Brachypodium distachyrum* (L.) Beauv. — A: Kenan-Tepe (Feuerberg.); Antigoni (W 179).
- B. pinnatum* (L.) Beauv. var. *caespitosum* Koch. — Azn. MBL 12: 184. — E: Zwischen Halkali und Kalfa-Köj (Azn.).
- B. pinnatum* (L.) Beauv. var. *rupestre* (Host) Rchb. — E: Rumeli-Fanar, Raine. — Die var. *rupestre* wird bei Hayek Prodr. 3: 216 nur für die westlichen Balkanländer angegeben.
- B. ramosum* (L.) R. S. var. *phoenicoides* (L.) Koch? — A: Antigoni (W. 180).
- Agropyrum litorale* (Host) Dun. — A: Riva, Düne.
- Triticum monococcum* L. ssp. *boeoticum* (Boiss.) Hay. — Azn. BSBF 46: 152 (als var. *lasiorrhuehis* Boiss.). — E: Jedi-Kule (Azn.).
- Haynaldia villosa* (L.) Schur. — E: Jedi-Kule.
- Aegilops*¹⁾ *caudata* L. var. *polyathera* Boiss. — (Azn. BSBF 44: 177. — A.
- A. caudata* L. var. *Heldreichii* Boiss. — Azn. BSBF 44: 177 (als *A. turcica* Azn.). — A: Buge hinter Kartal (Azn.).
- A. ovata* L. — Azn. MBL 10: 19 (typ. und var. *macrochaeta* [Shuttl. & Huet]). — H. M. 207 (als *Triticum* o. [L.] Gren. Godr.). — E: Kiat-Hane. — A: Jakadschik Azn. — var. *macrochaeta*; Prinkipo (H. M.); Kartal; Brussa, Weg zu den Bädern.
- A. ovata* L. var. *vulgaris* Eig. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane; Hügel bei Kilia. — A: Kenan-Tepe bei Vani-Köj; Dschamlidscha.
- A. triaristata* Willd. — Azn. MBL 10: 19 (als *A. ovata* L. var. *triaristata* Coss & Dur.). — E: Schischli, trockene Hügel. — Verbr. (Azn.).
- A. triaristata* Willd. var. *vulgaris* Eig. — A: Kenan-Tepe bei Vani-Köj.
- A. triuncialis* L. — A: Brussa, sonniges Flußufer.
- A. uniaristata* Vis. — Azn. BSBF 44: 177. — A: Kenan-Tepe; Dschamlidscha (Azn.).
- Hordeum asperum* (Simk.) Degen — Azn. MBL 12: 184 (als *Elymus caput Medusae* L. var. *asper* Simk.). — A: Kenan-Tepe; Prinkipo, trockene, sonnige Stellen. — Verbr. (Azn.).
- H. maritimum* With. A: Antigoni (W. 170).

¹⁾ Die von Nemetz gesammelten Exemplare wurden von A. Eig. Jerusalem bestimmt.

- H. maritimum* With. ssp. *Gussoneanum* (Parl.) A. & Gr. — Azn. MBL 10: 21 (als var. *Gussoneanum* Richt. und typ.). — E: San Stefano; Zekerie-Köj (beide Azn.).
- H. murinum* L. — E: Jedi-Kule. — A: Brussa, sonniges Flußufer.
- H. murinum* L. ssp. *leporinum* (Lk.) A. & Gr. — Azn. MBL 10: 21 (als var. *leporinum* Ch. & B.). — E: Ejub; Schischli; Flamur. — A: Pascha-Bagtsche (sämtl. Azn.).
- H. spontaneum* Koch. — Azn. MBL 10: 21. — E: Jarim-Burgas (Azn.).
- Elymus sabulosus* M. B. — Degen 45: 68. — E: Ufer des Bosporus (Degen). — A: Jum Burnu, Düne.
- Sesleria argentea* Savi. — E: Kiat-Hane.
- Echinaria capitata* (L.) Desf. — Azn. MBL 12: 182. — A: (Azn.); Pendik, sonnige Stellen.
- Phragmites communis* Trin. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- Molinia coerulescens* Mnch. — Azn. MBL 10: 15. — E: Bagtsche-Köj (var. *viridiflora* Lej.) zwischen Kilia und R.-Feneri (var. *arundinacea* Gris.). — A: Zwischen Alem-Dagh und Tschatal-Dagh (var. *litoralis* Gris. f. *viripara* Mey.). — (Sämtl. Azn.).
- Eragrostis megastachya* (Koel.) Lk. — Azn. BSBF 44: 177. — A.
- E. minor* Host. — Azn. MBL 12: 183. — E, A. verbr.
- E. pilosa* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 177. — E.
- Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176. — E: Domus-Dere. — A: (Azn.).
- Melica ciliata* L. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane.
- M. ciliata* L. var. *Magnoliae* (Gr. & Godr.) Pant. — Azn. BSBF 46: 151 (als Art). — A: Zwischen Kartal und Maltepe (Azn.).
- M. uniflora* Retz. — A: Bei Beikos; Bithynischer Olymp, 1000 m.
- Briza maxima* L. — E: Schischli. — A: Josua-Dagh bei Beikos.
- B. media* L. var. *elatior* (S. & S.) Hal. — E: Wald bei Bagtsche-Köj.
- B. minor* L. — Azn. MBL 10: 15. — E: Kilia. — A: Maltepe (beide Azn.).
- Aelorropus litoralis* (Gou.) Parl. — Azn. BSBF 44: 177. — E, A.
- Dactylis glomerata* L. — Azn. MBL 12: 183. — Beg. 220. — H. M. 206. — Degen 45: 68. — E, A (Azn. — typ.). — E: Floria (Azn. — var. *hispanica* Koch) Kütschük-Tschekmedsche, Bahndamm (var. *hispanica*). — A: Zwischen Kartal und Maltepe (Azn. — f. *maritima*); zwischen Deresseki und Arnaut-Köj (Azn. f. *pendula*); Prinkipo (Beg. — var. *hispanica*); Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 166 — var. *hispanica*); Symplegiaden (Degen).
- Cynosurus cristatus* L. — A: Antigoni (W 163).
- C. echinatus* L. — H. M. 206. — E: Kiat-Hane; Schischli; zwischen Schischli und Kiat-Hane; Domus-Dere, Wiese. — A: Kenantepe bei Vani-Köj; Antigoni (W 162); Prinkipo (H. M.) — ? Messar-Burnu.
- Poa annua* L. ssp. *exilis* (Tomm.) Murb. — E: Kiat-Hane, große Wiese; Konstantinopel, Wege. — Die Unterart ist bei Hayek, Prodr. III. 258 für Thrazien nicht angegeben.
- P. bulbosa* L. — Azn. BSBF 46: 151. — Beg. 220. — E: Kütschük-Tschekmedsche. — A: Kaisch-Dagh, grasige Höhe; Prinkipo (Beg.).

- P. bulbosa* L. (meist monstr. *viripara* Koch). — Azn. BSBF 46: 151. — E: Kiat-Hane, große Wiese; Dschendere; Kilia, Düne; Bagtsche-Köj, Wiese. — A: Bithynischer Olymp, 1000 m; Antigoni (W. 167).
- P. compressa* L. — Azn. BSBF 46: 151. — E: Zekeri-Köj (Azn.).
- P. pratensis* L. ssp. *angustifolia* (L.) Hay. — Azn. BSBF 46: 151 (als Art). — E: Am Schehidler oberhalb Rumeli-Hissar (Azn.).
- P. pratensis* L. var. *attica* (Boiss. & Heldr.) Boiss. — Azn. BSBF 46: 151 (als Art). — E: San Stefano (Azn.).
- P. silvicola* Guss. — Azn. MBL. 10: 15. — E: Jedi-Kule. — A: Adam-Pol; Halkali (Azn.).
- Glyceria maxima* (Hartm.) Holmbg. var. *arundinacea* (M. B.) Hay. — Azn. MBL 10: 16 (als *G. aquatica* Wahlb. var. *a.*) — E: Jarim-Burgas (Azn.).
- G. plicata* Fries. — Azn. BSBF 44: 177. — E.
- Puccinellia distans* (L.) Parl. — Azn. BSBF 46: 152 (als *Atropis d. Gris.*) — E: Zwischen Makri-Köj und Jedi-Kule (Azn.).
- Festuca arundinacea* Schreb. var. *mediterranea* (Hack.) Richt. — Azn. BSBF 46: 152 (als *F. Fenas* Lag.). — E: Kilia; Belgrad-Köj; Maslak. — A: Maltepe (sämtl. Azn.).
- F. heterophylla* Lam. — Azn. BSBF 46: 152. — A: Quelle von Böyük-Emali am Ostabhang des Alem-Dagh (Azn.).
- F. vallesiacaca* Schleicher — det J. Vetter. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane.
- Vulpia ciliata* (Danth.) Lk. — Azn. MBL 10: 17 (als *Festuca Danthonii* A. & Gr.). — A: Kenan-Tepe; Brussa, sonniges Flusser; Halki (Azn. — typ. und var. *imberbis* Vis.).
- V. dertonensis* All. — Azn. MBL 10: 17. — E: Schischli (var. *longiaristata* und subvar. *hebestachya* Azn.). — (Sämtl. Azn.).
- V. fasciculata* (Forsk.) Fritsch. — Azn. BSBF 44: 177 (als *V. uniglumis* Sol.). — E, A.
- V. ligistica* (All.) Lk. — Azn. MBL 10: 17. — A: Merdiven-Köj (Azn.).
- V. myurus* (L.) Gmel. — BSBF 44: 177; MBL 10: 16 (f. *fallax* Azn., var. *hirsuta* Hack.). — E: Schehidler bei Rumeli-Hissar. (Azn. — var. *hirsuta*). — A: Kenan-Tepe; Dschamlidscha (Azn. — f. *fallax*).
- Scleropoa rigida* (L.) Gris. — E: Konstantinopol; Stadtmauer bei Jedi-Kule; Kütschük-Tschechmedsche, Bahndamm. — A: Gök-Su; Brussa, Spitalberg; Antigoni (W. 70).
- Lolium loliaceum* (Bor. & Chaub.) H. M. — Azn. BSBF 46: 152 (als *L. rigidum* Gaud. var. *rottboellioides* Heldr.). — E: Floria (Azn.). — Antigoni (W. 177).
- L. multiflorum* Lam. — Azn. BSBF 46: 152. — A: Gök-Su; Prinzeninseln (var. *muticum* Gris.) — (heide Azn.).
- L. perenne* L. — Azn. BSBF 46: 152 (var. *tenue* [L.] Schrad.). — E: Kilia, Düne; Kütschük-Tschechmedsche, Bahndamm; Schischli. — A: Kenan-Tepe; zwischen Maltepe und Bostandschik (Azn.).
- L. strictum* Presl. — E: Kütschük-Tschechmedsche, Bahndamm.

- L. temulentum* L. — Azn. BSBF 46: 177. — E: (Azn.); Balukli; zwischen Schischli und Kiat-Hane. — A: (Azn. — var. *muticum* Boiss.).
- Pholiurus filiformis* (Roth) Schinz & Thell. — Azn. BSBF 44: 177 (als *Lepturus* f. Trin.). — E, A.
- Psilurus aristatus* (L.) Duv. Jouvé. — Azn. 44: 177 (als *P. nardooides* Trin.). — E, A.
- Koeleria hispida* (Savi) DC. — Azn. BSBF 46: 151. — E: Jedi-Kule. — A: Pendik (beide Azn.).
- K. nitidula* Vel. var. *obscura* (Vel.) Domin — Azn. MBL 12: 183. — E: Jarim-Burgas. — A: Skutari (beide Azn.).
- K. phleoides* (Vill.) Pers. — Azn. MBL 12: 183 (typ. und var. *robusta* Borb.). — Beg. 220. — A: Brussa, sonniges Flussufer; Prinkipo (Azn., Beg.).
- Avellinia Michelii* (Savi) Parl. — Azn. BSBF 46: 151 (als *Koeleria m-* Coss.). — A: Prinkipo; Halki (beide Azn.).
- Ventenata dubia* (Leers) F. Schultz — Azn. BSBF 44: 176. — A.
- Avena barbata* Brot. — Azn. MBL 10: 15 (var. *Wiestii* [Steud.] Hausskn.) — H. M. 206. — Beg. 220 (als *A. hirsuta* Mnch.). — E: Kiat-Hane-Köj (Azn.). — A: Böyük-Dschamlidscha (Azn.) Prinkipo (H. M., Beg.).
- A. fatua* L. — A: Antigoni (W. 161).
- A. sterilis* L. — Azn. MBL 12: 182 (typ. und var. *pilosa* Azn.). — E: Jedi-Kule. A. (Azn. — var. *pilosa*).
- Arrhenatherum elatius* (L.) M. K. — Azn. BSBF 44: 176.
- A. palaestinum* Boiss. — Azn. MBL 10: 15 (als var. von *A. elatius*). — A: Beikos (Azn.).
- Gaudinia fragilis* (L.) Beauv. — A: Kenan-Tepe bei Vani-Köj.
- Holcus lanatus* L. — A: Jum-Burnu; Antigoni (W. 165).
- H. setiglumis* Boiss. & Reut. — Azn. BSBF 46: 151 (als *H. annuus* Salzm.). — A: Zwischen Maltepe und Drakoshügel (Azn.).
- Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176. — A.
- Corynephorus articulatus* (Desf.) Beauv. — Azn. 44: 176. — E: Kütschük-Tschekmedsche.
- Aira capillaris* Host — Azn. MBL 10: 15 (var. *ambigua* [de Not.] Asch.). — H. M. 206. — E: Zwischen Schischli und Kiat-Hane-Köj (Azn.). — A: Maltepe (Azn.); Dschamlidscha; Kenan-Tepe; Armeni-Köj; Ins. Antigoni (Azn.); Prinkipo (H. M.).
- Molinaria minuta* (Löfl.) Parl. — E: Kiat-Hane.
- Ammophila arenaria* (L.) Lk. — Azn. BSBF 44: 176. — E.
- Apera interrupta* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176 (als *Agrostis i.* L.). — A.
- Agrostis alba* L. — Azn. MBL 12: 182; BSBF 46: 151: (var. *scabriglumis* [Boiss. & Reut.] Boiss.; var. *aristata* Boiss.; var. *maritima* [Lam.] Mey). — E: Makriköj (v. *scabriglumis*); Skumruköj (v. *aristata*); Jedi-Kule (v. *aristata*); zwischen Domus-Dere und Kilia (var. *maritima*). — A: Kartal (v. *scabriglumis*). — (sämtlich Azn.).

- A. castellana* Boiss. & Reut. var. *byzantina* (Boiss.) Hack. — Azn. BSBF 46: 151 (als *A. olivetorum* Gr. Godr.). — A: Gipfel des Jakadschik-Dagh (Azn.).
- A. verticillata* Vill. — Azn. BSBF 44: 176. — E: (Azn.); Konstantinopel.
- Gastridium ventricosum* (Gou.) Schinz et Thell. — A: Antigoni (W 335).
- G. seabrum* Presl. — Azn. BSBF 44: 176. — E. A.
- Polypogon maritimus* Willd. var. *subspathaceus* (Requ.) Duby — Azn. MBL 10: 15. — E: Silihdar-Aga (Azn.).
- P. monspeliensis* (L.) Desf. — Azn. MBL 12: 182. — A: Kalamisch (Azn.).
- Lagurus ovatus* L. — Degen 45: 68. — E: Domus-Dere, Düne. — A: Tusla, Düne; Riva (Degen).
- Sporobolus arenarius* (Gou.) Duv. — Azn. BSBF 46: 151 als *S. pungens* Knth.). — A: Tusla; Kartal (beide Azn.).
- Alopecurus bulbosus* „L.“ Gou.? — Azn. BSBF 44: 176. — A. — Das Vorkommen dieser atlantischen Art im Gebiete ist zu bezweifeln.
- A. creticus* Trin. — Azn. MBL 12: 181. — E: Bebek (Azn.).
- A. myosuroides* Huds. — Azn. BSBF 44: 176 (als *A. agrestis* L.) — E: (Azn.). — A: Antigoni (W. 183).
- A. setariooides* Gren. — Azn. MBL 12: 181; MBL 10: 278 (als *A. neglectus* Azn.). — E: Schischli; Pankaldi; Arnaut-Köj; Kürüt-scheschme. — A: Haidar-Pascha; Moda. (Sämtl. Azn.).
- A. utricularius* (L.) Pers. — E: Dschendere; Orta-Köj; Kiat-Hane. — A: Dschamlidscha.
- A. vaginatus* Willd. var. *cassius* Boiss. — det. Fritsch. — A: Bithynischer Olymp, 2200 m.
- A. ventricosus* Pers. — Azn. BSBF 46: 151 (als *A. arundinaceus* Poir.). — E: Jedi-Kule (Azn.).
- Heleochoea schoenoides* (L.) Host — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- Phleum arenarium* L. — Azn. BSBF 44: 167. — E.
- P. graecum* Boiss. & Heldr. — Azn. MBL 10: 14. — E: Zwischen Schischli und Flamer (Azn.).
- P. phleoides* (L.) Simk. var. *ciliatum* (Cel.) Hay. — A: Dschamlidscha.
- P. subulatum* (Savi) A. & Gr. — H. M. 206. — Degen 45: 68 (als *P. tenuie* Schrad.). — E: Orta-Köj. — A: Kenan-Tepe; Prinkipo (H. M.); Antigoni (W 185). — Symplegiaden (Degen).
- Stipa bromoides* (L.) Brand. — H. M. 205. — Beg. 220 (als *S. Aristella* L.). — A: Prinkipo (Beg., H. M.); Antigoni (W 178).
- S. pennata* L. — Azn. BSBF 44: 176; MBL 10: 14 (ssp. *mediterranea* [Trin. & Rupr.] A. & G. als var. *Grafiana* [Stev.] Lindemann). — A: Zwischen Aidinli und Pendik; Gipfel des Jakadschik-Dagh (beide Azn.).
- Oryzopsis caeruleescens* (Desf.) Richt. — A: Antigoni (W. 172).
- O. miliacea* (L.) Asch. & Schweinf. var. *Thomasii* (Duby) Richt. — Azn. MBL 12: 182. — A: Zwischen Kartal und Soghanli (Azn.).
- Anthoxanthum odoratum* L. — Azn. MBL 10: 14 (var. *villosum* Lois., var. *longearistatum* Cel.). — Beg. 220. — E: Bagtsche-Köj; Kiat-Hane, große Wiese. — A: Pendik Azn. — (v. *longearistatum*); Ins. Antigoni (Azn. var. *villosum*; W 164); Prinkipo (Beg.).

- Phalaris brachystachys* Lk. — Azn. BSBF 44: 176. — E: (Azn.); San Stefano, Strand.
- P. canariensis* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- P. minor* Retz. — A: Antigoni (W 184).
- P. paradoxa* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- Beckmannia eruciformis* (L.) Host. — Azn. BSBF 46: 150. — E: Jedi-Kule. — A: Zwischen Jakadschik und Bakal-Köj. (Azn.).
- Cynodon daetylon* (L.) Pers. — Beg. 220. — A: Jum-Burnu; Prin-kipo (Beg.).
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. — Azn. BSBF 44: 176 (als *Panicum s.* L.); MBL 10: 13 (f. *biverticillata* Reynier). — A: Maltepe; Gök-Su (beide Azn. — f. *biverticillata*): Antigoni (W 181).
- Panicum crus galli* L. v. *brevisetum* Döll. — Azn. MBL 12: 181; BSBF 176 (als *P. echinatum* Willd.). — E.
- P. eruciforme* S. & S. — Azn. BSBF 46: 150. — E: Skumru-Köj. — A: Maltepe (beide Azn.).
- P. milaceum* L. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- Setaria ambigua* Guss. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- S. glauca* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176. — E.
- S. italicica* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176. — E, A.
- S. verticillata* (L.) Beauv. — Azn. MBL 12: 181. — E: Rumeli-Fanar, Rain. — A: Zwischen Kartal und Jakadschik (Azn.).
- S. viridis* (L.) Beauv. — E: Orta-Köj. — A: Antigoni (W 77).
- S. viridis* (L.) Beauv. var. *ambigua* Cass. — A: Antigoni (186).
- Imperata cylindrica* (L.) Beauv. — Azn. BSBF 44: 176. — Degen 45: 68. — E: (Azn.); San Stefano, Strand. — A: (Azn.); Riva (Degen).
- Erianthus Hostii* Grisch. — E: Schischli.
- Phacelurus digitatus* (S. & S.) Gris. — Azn. BSBF 44: 176. — E.
- Chrysopogon Gryllus* (L.) Trin. — Azn. BSBF 44: 176; MBL 10: 14 (var. *flavescens* Schur). — E: (Azn.). — A: (Azn.); Dolaiba (Azn. — var. *flavescens*).
- Sorghum halepense* (L.) Pers. — A: Antigoni (W 171).

Orchidaceae¹⁾.

- Ophrys apifera* Huds. — Azn. MBL 5: 167. — E: San Stefano (Azn.).
- O. aranifera* Huds. ssp. *atrata* (Lindl.) Hay. — Azn. BSBF 46: 148 (als Art). — E: San Stefano (Azn.).
- O. mammosa* Desf. — E: Kütschük-Tschekmedsche.
- O. oestrifera* M. B. — E: San Stefano (W 310).
- O. speculum* Lk. — E: San Stefano, Bahndamm; Makri-Köj (W 311).
- Orchis lactea* Poir. — Azn. BSBF 44: 184. — E: Kiat-Hane (Nemetz, W 313); Kütschük-Tschekmedsche. — A: (Azn.); Aidos-Dagh bei Kartal.
- O. laxiflora* L. — E: Domus-Dere. — A: Beikos, große Wiese.

¹⁾ Die von Nemetz gesammelten Orchidaceae wurden von Dr. J. Renz, München bestimmt. — Zahlreiche Fundortsangaben finden sich bei Soó, Revision der Orchideen Südosteuropas und Südwestasiens. Bot. Archiv 23 (1928).

- O. pallens* L. — A: Bithynischer Olymp, unter dem Gipfel (E. Nelson mündl.).
- O. papilionacea* L. — E: Kiathane (W 314). — A: Josua-Dagh bei Beikos; Kenan-Tepe bei Tschengel-Köj.
- O. picta* Lois. — E: Böyük-Dere. — A: Josua-Dagh bei Beikos.
- O. pinetorum* Boiss. et Kotschy — A: Bithynischer Olymp (E. Nelson mündlich).
- O. purpurea* Huds. — Azn. BSBF 44: 174 (als *O. fusca* Jacq.). — A.
- O. romana* Seb. — Krause 1: 826 (als *O. pseudo-sambucina* Ten.). — E: Waldrand bei Bagtsche-Köj; Kiat-Hane; Dschendere; Konstantinopel (W 315). — A: Dschamlidscha; Kenan-Tepe bei Tschengel-Köj; Kaisch-Dagh (Nemetz, Krause).
- O. saccata* Ten. — Azn. BSBF 44: 174. — E.
- Serapias cordigera* L. — E: Böyük-Dere; Bagtsche-Köj. — A: Dschamlidscha.
- S. laxiflora* Chaud. — Azn. MBL 1: 292. — E.
- S. vomeracea* (Burm.) Briq. — Azn. MBL 1: 292 (als *S. pseudocordigera* Mor.) — E: Böyük-Dere (Azn.) — A: Halki (Azn.); Antigoni (W 316).
- Platanthera bifolia* Rchb. — E: Bagtsche-Köj; Belgrader Wald; Böyük-Dere. — A: Josua-Dagh; Armeni-Köj.
- P. chlorantha* (Custer) Rchb. — Azn. BSBF 44: 174 (als *P. montana* Rchb.). — E, A.
- Neotinea intacta* (Lk.) Rchb. — Azn. BSBF 44: 171 (als *Tinea i.* Boiss.). — A.
- Epipactis latifolia* All. (bei Hayek Prodr. *Helleborine*). — Azn. BSBF 44: 174. — E, A.
- E. microphylla* Ehrh. — Azn. BSBF 44: 174. — A.
- Cephalanthera alba* (Cr.) Simk. — A: Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- C. longifolia* (L.) Fritsch — Azn. BSBF 44: 174 (als *C. ensifolia* Rich.) — E: (Azn.); Zekerie-Köj; Bagtsche-Köj. — A: (Azn.); Fuß des Bithynischen Olymp, Wald bei Ak-Dschellan.
- Limodorum abortivum* Sw. — E: Belgrader Wald bei Dschendere; Wald bei Bagtsche-Köj. — A: Antigoni (W 312).
- Spiranthes spiralis* (L.) K. Koch — Azn. BSBF 44: 174 (als *S. autumnalis* Rich.) — E: (Azn.). — A: (Azn.); Dschamlidscha; Tschengel-Köj.
- Listera ovata* (L.) R. Br. — Azn. BSBF 44: 174. — E, A.
- Neottia nidus avis* (L.) Rich. — Azn. BSBF 44: 174 — E, A.

Araceae.

- Arum italicum* Mill. — E: Belgrader Wald bei Bagtsche-Köj; Therapia. — A: Pendik; Tusla.
- A. orientale* M. B. — Azn. BSBF 44: 174. — E: (Azn.). — A: (Azn.); Kartal; Kütschük-Gök-Su.
- Dracunculus vulgaris* Schott. — A: Tusla.

Lemnaceae.

Lemna gibba L. — Azn. BSBF 44: 174. — E

Sparganiaceae.

Sparganium erectum L. ssp. *neglectum* (Beeby) Hay. — Azn. BSBF 46: 148 (als Art). — E: Makri-Köj. — A: Beikos (beide Azn.).

Typhaceae.

Typha angustata Bory & Chaub. — Azn. MBL 12: 179. — E: Küt-
schük-Tscheckmedsche, am See; Domus-Dere (Azn.). — A: Bei-
kos, Wasseransammlung im Wald.

Nachträge.

- S. 15. *Fumaria Thuretii* Boiss. var. *thasia* Pugsley — Bornmüller, Symbolae Anatolicae (Fedde Rep. Beih. 89), p. 24. — A: Prinkipo (Noe).
- S. 18. *Teesdalia coronopifolia*. — A: Prinkipo (Bornm. 13809; aus Bornm. Symbolae Anatolicae [Fedde Rep. Beih. 89, p. 70]).
- S. 24. *Potentilla laciniosa* W. K. var. *subsericea* (Gris.) Th. Wolf — Haussknecht, Mitteilungen d. Thüringischen Botanischen Vereins, N. F., 5: 94 (als *P. subsericea* Gris.) — E: Kestansu bei Böyük-Dere (Cumania).
- S. 24. *Potentilla Detomasii* Ten. — Haussknecht l. c. (grauseidig behaarte Form) — E: Böyük-Dere, Belgrader Wald (Cumania).
- S. 24. Zu *Sedum proponticum* Azn. — A: Dschamlidscha (A. Pircher in Herb. Mus. Wien); wurde vom Monographen Fröderström als *S. obtusifolium* C. A. Meyer var. *Listoniae* (Vis.) Fröderström bestimmt.
- S. 30. Zu *Trifolium Meneghinianum* Clem. — Aznavours in Dörflers Herb. norm. unter Nr. 4863 unter diesem Namen aus gegebene Konstantinopler Pflanze stellt nach Bornmüller in Englers Bot. Jahrb. 69: 480 eine sehr üppige Form von *T. nigrescens* Viv. var. *polyanthemum* Ten. (pro specie) dar.
- S. 31. *Genista ptilophylla* Spach. — E: Belgrader Wald (Hügler); Marlak (Clementi); nach Bornm. l. c. p. 463.
- S. 40. *Verbascum lasianthum* Boiss. — Murbeck, Monogr. *Verbascum*, 230. — A: Dschamlidscha (Schwöder); Ufer des Bosporus bei Kusundschik (Krause).
- S. 44—46. *Thymus glaucus* Friv. ap. Boiss. var. *hellesponticus* Deg. & Urum. MBL 19: 18; Spis. Blg. Ak. 25: 191. — E: (Urumoff). *Thymus longidens* Vel. var. *proponticus* Ronn. ap. Rech. fil. ÖBZ 85: 61. — E: (Nemetz).
Thymus Sintenisii Čelak. — Ronniger ap. Hayek Prodr. Fl. Balc. 2: 365. — E.
Thymus thracicus Vel. var. *byzantinus* Ronn. ap. Hayek l. c. p. 347. — E.
Thymus thracicus Vel. var. *Wimmeri* Ronn. ap. Hayek l. c. p. 348 (pro forma). — E.
- S. 56. *Lactuca viminea* (L.) Presl. — A: Antigoni (W. 403).
- S. 57. Zu *Hieracium*. Verstreute, die Flora von Konstantinopel betreffende Angaben finden sich in Zahn, *Compositae-Hieracium* in Engler, Das Pflanzenreich IV, 280.
- S. 59. *Polygonatum pruinatum* Boiss. — Bornmüller, Engl. Bot. Jahrb. 61, Beiblatt 140: 146. — Konstantinopel (Cumania).


Berichtigungen.

- S. 1. Zeile 4 von oben: Statt veröffentlichten gleichnamigen Arbeit lies: unter dem Titel „Beitrag zur Flora von Konstantinopel“ veröffentlichten Arbeit.
 Zeile 8 von oben: Statt Keisler lies Keissler.
 Zeile 9 von oben: Statt Matauschek lies Matouschek.
- S. 17. Statt *Alyssum campestre* L. var. *micropelatum* lies *micropetalum*.
 S. 19. Statt *Cistus villosus* L. ssp. *creticus* (L.) Cr. lies ssp. *creticus* (L.) Hay.
 S. 26. Statt *Cersis* lies *Cercis*.
 S. 27. Anmerkung. Statt Šyrjaev lies Širjaev.
 S. 29. Anmerkung. Statt Spez. novar. lies spec. novar.
 S. 33. *Holarrhagidaceae* lies *Halorrhagidaceae*.
 S. 46. Statt *L. Lagopus* lies *P. Lagopus*.
-



Familienregister.

<i>Abietaceae</i> 5	<i>Equisetaceae</i> 4	<i>Platanaceae</i> 8
<i>Aceraceae</i> 23	<i>Ericaceae</i> 36	<i>Plumbaginaceae</i> 36
<i>Alismataceae</i> 57	<i>Euphorbiaceae</i> 8	<i>Polygalaceae</i> 23
<i>Amarantaceae</i> 10	<i>Fagaceae</i> 6	<i>Polygonaceae</i> 8
<i>Amaryllidaceae</i> 59	<i>Gentianaceae</i> 46	<i>Polypodiaceae</i> 4
<i>Anacardiaceae</i> 23	<i>Geraniaceae</i> 22	<i>Portulacaceae</i> 10
<i>Apocynaceae</i> 47	<i>Globulariaceae</i> 46	<i>Potamogetonaceae</i> 57
<i>Araceae</i> 69	<i>Gramineae</i> 62	<i>Primulaceae</i> 36
<i>Araliaceae</i> 33	<i>Guttiferae</i> 20	<i>Rafflesiaceae</i> 13
<i>Aristolochiaceae</i> 13	<i>Halorragidaceae</i> 33	<i>Ranunculaceae</i> 13
<i>Asclepiadaceae</i> 47	<i>Iridaceae</i> 60	<i>Resedaceae</i> 18
<i>Berberidaceae</i> 13	<i>Juncaceae</i> 60	<i>Rhamnaceae</i> 23
<i>Betulaceae</i> 5	<i>Labiatae</i> 42	<i>Rosaceae</i> 24
<i>Boraginaceae</i> 37	<i>Lauraceae</i> 13	<i>Rubiaceae</i> 47
<i>Callitrichaceae</i> 33	<i>Lemnaceae</i> 70	<i>Rutaceae</i> 23
<i>Campanulaceae</i> 49	<i>Liliaceae</i> 57	<i>Salicaceae</i> 7
<i>Cannabaceae</i> 7	<i>Linaceae</i> 21	<i>Santalaceae</i> 7
<i>Capparidaceae</i> 16	<i>Lobeliaceae</i> 50	<i>Saxifragaceae</i> 24
<i>Caprifoliaceae</i> 48	<i>Loranthaceae</i> 7	<i>Scrophulariaceae</i> 40
<i>Caryophyllaceae</i> 10	<i>Lythraceae</i> 32	<i>Solanaceae</i> 39
<i>Celastraceae</i> 23	<i>Malvaceae</i> 20	<i>Sparganiaceae</i> 70
<i>Chenopodiaceae</i> 9	<i>Moraceae</i> 7	<i>Styracaceae</i> 37
<i>Cistaceae</i> 17	<i>Najadaceae</i> 57	<i>Tamaricaceae</i> 19
<i>Compositae</i> 50	<i>Nymphaeaceae</i> 15	<i>Theligonaceae</i> 10
<i>Cornaceae</i> 33	<i>Oenotheraceae</i> 33	<i>Thymelacaceae</i> 32
<i>Convolvulaceae</i> 37	<i>Oleaceae</i> 47	<i>Tiliaceae</i> 21
<i>Crassulaceae</i> 23	<i>Ophioglossaceae</i> 4	<i>Thyphaceae</i> 70
<i>Crucifereae</i> 16	<i>Orchidaceae</i> 68	<i>Ulmaceae</i> 7
<i>Cucurbitaceae</i> 20	<i>Orobanchaceae</i> 42	<i>Umbelliferae</i> 33
<i>Cupressaceae</i> 5	<i>Osmundaceae</i> 4	<i>Urticaceae</i> 7
<i>Cuscutaceae</i> 37	<i>Oxalidaceae</i> 21	<i>Valerianaceae</i> 49
<i>Cyperaceae</i> 61	<i>Papaveraceae</i> 15	<i>Verbenaceae</i> 42
<i>Dioscoreaceae</i> 60	<i>Papilionaceae</i> 26	<i>Violaceae</i> 19
<i>Dipsacaceae</i> 49	<i>Phytolaccaceae</i> 10	<i>Vitaceae</i> 23
<i>Ephedraceae</i> 5	<i>Plantaginaceae</i> 46	<i>Zygophyllaceae</i> 22



Biblioteka
W. S. P.
w Gdańsku

0451

C-II-1798

729/100 R.